

BELLIS MINORIS TRES SPECIES.



fuscula, solo procumbentia, & in rose modum radiantia, atque per ambitum sensim serrata; flores tamen coloribus
 & foliorum numero inter se variant. Siquidem in uno genere centroteus aurei & per ambitum, rubentibus foliis stipati
 cernuntur, in altero uero ex candido rufescentibus, aut uersicolorib. numerosioribusq;. Sunt etiam qui intus rubri sint, & in am- 60
 bitu albi, quinetiam qui ubiq; foliis uersicoloribus adeo stipati habeantur, ut sericinos floccos penè referant. Omnes hoc tem-
 pore in Coronamenta uenere. Nam ob cauliculorum molliem, & colorum præstantiam, texendis coronis apissimi sunt.
 Florent anno ferè toto si cultorum diligentia non desit. Facultas omnibus eadem: nam (ut recentiores perhibent) valent
 in firionis, & capitis fracturis: quætiæ in uulneribus thoracis, quæ in pectoris cavitatem usque penetrant, in quæ-
 usum Bellim potioribus inserunt. Sunt & qui Bellidis genera laudent ad ischiada, & paralyfin. Sanant comman-
 lia cum oris, tum Lingue exulceratas pustulas, eadem tusa genitalium inflammationes extinguunt, ac etiam resoluunt.
 Herba ipsa recens in acetarijs deuorata, alium adstrictam lenit, id quod etiam præstat ex uere pinguium carniem decocta.
 Bellidæus sic Græcè, Latine uerò Bupthalmum, & Oculis bonis dicitur; Arabice, Bicar; Italiè: Buptharmo, & Oc-
 chio di huc. Bellis, Italis primo flore, & fior di primavera dicitur.

Nomine.

Paeonia.

PAEONIA.

CAP. CXL.

Paeonia, sive glycyfide, Graecis aliquibus pentoboron dicitur. sunt qui Idaeos dactylos radicem paeoniam vocant. Caulis altitudine sesquipedis adolescit, comitantibus multis stolonibus. Huius duo genera: mas folia iuglandis habet: in foemina uero smyrnij more diuiduntur. Summo caule siliquas emittit amygdalis similes: in quibus, cum dehiscunt, multa grana exigua, rubra, acinis puni-
 10 corum similia inueniuntur, & in medio nigra, purpurea quinque aut sex. Radix maridigitali crassitudine, & palmi longitudine, gustu adstringens, alba. foeminae radicibus ceu glandes circiter septem aut octo inhaerent, ut in haustula regia. Foeminis a partu non purgatis sicca radix datur: ciet menses

PAEONIA MAS.



amygdale

PAEONIA FOEMINA.



amygdalæ magnitudine pota uentris doloribus cum uino pota auxiliatur . ualet contra regium morbum, & renum, ac uesicæ dolores. decocta in uino ^aalum sistit. Rubra grana rubentes menses sistunt, decem vel duodecim pota in uino austero, & nigro: stomachicis, & erosionibus ea esse prodest: à pueris pura initia calculorum eximunt. Grana nigra auxiliantur suppressionibus nocturnis, uuluz stragulationibus, & matricis doloribus, quindecim numero pota, in aqua mullâ, aut uino . Nascitur in altissimis montibus, & præruptis.

^a Cateuz. ad
dir. 164
p. 107.
p. 107.
p. 107.
p. 107.

Paeonia confi-
deratio.

Paeonia foemina planta est vulgaris notitia: mas uero contra, quod paucis in Italia locis proueniat. Hanc Pisis ad me Goritiam misit hoc anno Lucas Ghinus Ferocorneliensis, uir & doctrina, & rei medicae cognitione praclarus. Sed & eam antea à Germania allatam uideamus. Paeonia hystoriam, & uires descripsit Plinius libro 27. cap. 10. his uerbis.
Glycyde.

Glycyfide, quam aliqui Pœoniam aut pentorobon vocant. caulem habet duum cubitorum, comitantibus duobus, aut tribus, subterrimum, cute laevi, folia qualia Iſtatis pinguiora, rotundioraque, ac minorâ. Semen in ſiliquis, aliud grano rubente, aliud nigro. Duo autem genera ſunt. Fœmina exſtimator, cuius radicibus ceu balani longiores circiter octo aut ſex adherent. Mas plures habet, & quoniam non una radice mixtus eſt, palmi altitudine, candidaque. Ea gluſu adſtringit. Fœmina ſola Myrrham redolens, & denſiora ſunt. Naſcuntur in ſylvis. Tradunt noctu effodientas, quoniam pice marito impetu in oculis faciente, inter duo periculoſum ſit. Radix vero cum effodiat, periculum eſt, ne ſedes præcidant. Magna id vanitate ad oftentationem rei fictum arborum. Hæc Plinius. in quibus à Dioſcorido diſſentit, quod mari plures ſcripſit eſſe radices quam feminæ, quod ſit vt ſuſcipit Plinij lectionem vitio haud carere. Pœonia vires poſterioris memorie tradidit Galenus libro 6. ſimpl. medic. vbi hæc ſcriptum reliquit. Glycyfide, quam pentorobon, & pœoniam nuncupant, radicem habet leuiter adſtringentem cum quadam dulcedine: eſt i pluſculum dentibus mandas, acrimoniâ item quampiam ſubamaram ſubſeſe percipies. Proinde menſes ciet ex melicrato amygdala pota quantitate. Sanè tundere eam oportet, ac cribrare, & ſic inſpergere. Expurgat porro etiam icetur obſtructum, & venes. Sed hæc eſſicere nata eſt, quæ acris, & ſubamara eſt: quæ verò quiddam etiam adſtrictorium obtinet, ventris fluxiones ſiſtere poteſt. Verum eâ tunc in aſtærorum vinorum quoniam decoctam bibere conuenit. Eſt autem facultate omnino reſoluetiva vehementer, ita vt non deſſerauerim eam etiam addolgitam, quod merito creditum eſt, puerorum epilepſiam ſanare. Equidem vidi puellum quandoque octo totis menſibus modo comitiali liberum, ex eo quo geſtabat radicē tēpore: vbi verò forte fortuna quod à collo ſuſpenſum erat decidiffet, protinus morbo correptus eſt. rursuſque ſuſpenſo in locum illius alio, incuſpatē poſtea habuit. Porro viſum eſt mihi ſatus eſſe denuo id collo detrabere certioris experientie gratia. Id cum feciffem, ac puer iterum eſſet conuulſus, magnam recentis radicis partem ex collo eius ſuſpendimus: ac deinceps prorſum ſanus effectus eſt puer, nec poſtea conuulſus eſt. Rationabile itaque erat aut partes quaſpiam à radicē deſcendentes, ac deinde per inſpirationem attachas, ita affectus locos curare, aut aeream à radicē aſſiduè mutari, & alterari. Nam hoc pacto ſuccus Cyrenæicus colomellam phlegmone affectam inuat, & melanthium frictum palam deſtillationes, & grauēdines deſecat, ſi quis id in calidum linteum varum liget, aſſiduèque calorem ex eo per inſpirationem, que per nares fit, attrahat. Quinetiam ſi compluribus linnis, & maxime maris purpureæ collo uiperæ iniectis, illis viperam preſores: eaque poſtea cuiuſpiam collo obvincas, miſiſicè proferit tum tonſillis, tum omnibus ijs, que in collo expullulant. Sed de talibus priuatum aliquando forte conſcribam. Nunc verò ſciendum eſt Pœonia temperamenti tenuium eſſe partium & exiccatoriam, haud tamen inſiguitur calidam, ſed aut ſymmetricum, aut paulò calidius. Hæc Galenus. Quibus patet pœonia radicem collo ſuſpenſam, non quidem deorantem puerorum epilepſiam curare, quanquam plurimi ſunt medici, qui eam ad comitiales potandam præbeant. Cæterum hoc æuo Galeni de ſuſpenſa pœonia teſtimonium plurimos ſeſellit medicos. quod ſit, vt mihi dubitandum ſi an Pœonia vulgaris eſt ſit, de qua ſcribit Galenus. Præſtat Pœonia noſtra ſemen ad amiffam loquelam, ſi eius triginta: grana à cortice repurgata, & in puluerem contrita ex vino propinentur. Valent eadem, ac pariter radices ad ſerpenſium morſus, non ſolum ſolis, ſed etiam impoſita. Non deſunt muliercule, que, perforata pœonia ſemina, & filo trahenti eoralliorum modum ſunt inſtantibus, & pueris collo circumligent, quod patent hoc anulo Epilepſiam arceri. Hæc planta Græcis καυαία & πœonia, Latinis item Pœonia nuncupatur: Arabibus, Feonia: Italis, Pœonia: Germanis, Pœonien: Hiſpanis, Roſa del monte, & Roſa albardera: Gallis, Penœſte, & Pœinoie.

Pœonia uir ex Gal.

Galeni hiftoria.

Nomina.

Αἰθέρια

LITHOSPERMVV.

CAP. CXLII.

Lithospermon à feminis duritia nomen accepit. Folijs eſt oleæ longioribus, & latioribus, mollioribus, iacent humi, quæ ab radice exiliunt ramulis rectis, tenuibus, firmis, craſſitudine acuti iunci, lignoſis: in quorum cacumine bifidi exortus caulicorum ſpeciem exhibent: folijs longis: inter quæ paruum ſemen, rotundum, cui magnitudine, duritia lapidea. Naſcitur in aperſis, & editis locis. Vim hanc habet, ut ſemine cum uino albo potio calculos frangat, & pellatque urinam.

Lithospermon hodie ſepaſiarij, & omnes ſerè medici Barbaros ſecuti Milium ſolis nominant. Licet rectius forte ſe Mauritanorum quoque imitatione ab illis Milium Soler vocaretur. Quandoquidem hæc plantæ (vt ſcribit Serapio teſtimonio Aben Iudici) frequens naſcitur in montibus Boler: unde illi aptius forte à loco, quodam à ſole cognomenum imponeretur. Huius milij, utriuſque cognominatur, duo oftenduntur genera. maius, quod legitimum eſt Lithospermon, quoque Hetruria ſatis reſerta eſt. minus, quod longè frequentius ubique in Italia gignitur. Hoc huius nominis reſert, ſed arbuſculæ ſerè inſtar ſarſum caules mittit brachiatis, rotundosque, in quibus folia ſunt, vt in maiori oblonga, ſed minorâ, & firmiorâ, è quorum exitis ſemen oritur cauidum, pellucidum margaritarum modo, oblongum tamen, & facie, & quantitate milio ſimile; quod factum eſt, vt Milium Soler appellari cæperit. Cæterum Fuchſium, virum aliquo doctiſſimum, Lithospermon Dioſcoridis omnibus prope nunc competurum, non cognouiſſe arborum, quod in ſuis clariffimis de ſtirpium hiftoria commentarijs pro vero Lithospermo, illud quod officinis Milium ſolis minus appellatur, depinxerit. Idem nihil minus deinde mihi quidem videtur erraſſe in libro de compoſitione medicamentorum, quem nuper actum edidit: vbi ſcripſit tradidit Lithospermi genus eſſe plantam illam barungameam, ex cuius ſeminibus, que nos Lactyrmas vocamus, ſunt orbiculæ, quibus filo trahenti aduertunt mulieres ad ſuas preces numerandas. Hanc autem opinionem quoniam conſtatam eſt in Apologia, quam aduerſus Amatium Luſtratum, quem ſerè ſecutus eſt Fuchſius, ſcripſimus, hic vt ſatis alibi expoſitum reliquimus. Lithospermon, vt herbam ſumma admiratione dignam, eleganter deſcripſit Plinius libro 17. cap. 11. cuius hic verba ſubijciam. Inter omnes herbas, inquit, Lithospermo nihil eſt mirabilius. Aliqui egyptobon vocant, alij diopſyron, alij heraclea. Herba quinquæcualis ſerè, folijs duplo maioribus, quam ruta, ramulis ſarculoſis, craſſitudine iunci. Gerit iuxta folia ſingulas veluti barbulaſ, & earum in cacuminibus lapillos candore, & rotunditate margaritarum, magnitudine ciceris, duritia vero lapidea. Ipſi, que pediculis adhaerent, cauernas habent, & inuis ſemen. Naſcitur & in Italia, ſed laudatiſſimum in Creta. Nec quequam inter herbas maiore quidem miraculo conſpexi. Tantiuſ eſt decor, velut aſiſcicum arte alternis inter folia candidantibus margaritis, tam exquisita difficultas lapidis ex herba naſcentis. Iacere, atque humi ſerpere aurores tradunt. Ego uſuſam, non herentem vidi: hætenus Plinius. Factum utriuſque ſemen potandum vitibus pluribus ſequiſquæchæ pondere, addita aſplenij ſemidrachma, & ſi cœni ſtrupulis duobus, ex ſucco plantaginij, aut portulacæ, aut lactucæ ad gonorrhœam. Dantur quoque magno ſanè auxilio mi-

Lithospermi conſid.

Fuch. error.

Lithospermi hift. ex Plin.

ncris libo-

LITHOSPERMUM MAIVS.



Phalaridis vi-
res ex Gal.

Nomina

novis lithospermi seminis drachmę duę ex lacte muliebri potandę egrę parturientibus feminis . Nanque hoc tantum medica-
mento quam plures in partu laborantes adiutę sunt . Lithospermi in simplicium medicamentorum libris , Galenum meminisse
non inuenio . Quod Gręci λιθόσπερμος , Latini quoque Lithospermum vocant : Matritani, kulb, Culb, Calt, seu Calab : Itali, Li-
thospermo, & Milium solis : Germani, Meerhirsz, & Steinjomen : Galli, Grenil, & Herbe aux perles .

LITHOSPERMUM MINVS.



Φάλαρις. PHALARIS.

CAP. CXLII.

Phalaris cauliculis emittit zea culmis similes, à minutis, ac nullius vsus radicibus, multos & dum palmorum } geniculis cinctos, graciliores tamen, ac dulces: semen candidum, oblongum, mi-
lij magnitudine. Tunditur, & in aqua aut uino fuccus ad vesicæ cruciatus utilissimè bibitur. Semen
cochlearis mensura potum, ad eadem efficax est.

Phalaris genuinam referre hanc plantam, cuius hic imaginem excudi curauimus, quin sreadam nihil est quod probi-
beat. Siquidem calamos emittit zea; semen in spicatis capitibus, usque oblongis, candidum oblongum nilo simile.
Quinetiam radicibus nūtur minutis, & superuacuis. Phalaridis meminit Galenus libro octauo de simp. medic. facultatibus,
his verbis. Phalaridis herba tum semen tum succum, tum folia potu auxiliari creduntur vesicæ dolentes ceu in se habeant
quidpiam tenuium partium, & calidum. Scripsit de eadem & Plinius lib. 27. cap. 12. sic iniquens. Phalaris Thyrsium habet
longum tenuem ceu calanum, in summo florem inclinatum, semen simile sesame. Et hoc calculus frangit, potum ex uino,
vel aceto, & melle, & lacte. Idem & uita vesicæ sanat. Hæc ille.

Conclusa nō

legit Orib.

a Orib. legit.

Ιζοπέριον. i.

Vandriotes.

b Orib. add.

τῆ γὰρ σι, καὶ

τῆ φύλας, φῶ

τῆ φύλας, φῶ

τῆ φύλας, φῶ

τῆ φύλας, φῶ

τῆ φύλας, φῶ

τῆ φύλας, φῶ

τῆ φύλας, φῶ

τῆ φύλας, φῶ

τῆ φύλας, φῶ

τῆ φύλας, φῶ


τῆ φύλας, φῶ

τῆ φύλας, φῶ

τῆ φύλας, φῶ

Phalaridis cō-
sideratio

PHALARIS.



Erythrodanum.

RVBIA.

CAP. CXLIII.


Meum non te
gie conclusa.

Erythrodanum radix rubra est, qua tinguntur lana. Vna sponte provenit: altera seritur, ut in { The-
bana Gallia, } & Ravenna Italia: { in Caria } inter oleas, ut in arvis, solo creditur. Hanc non si-
ne quaestu serunt: nanque maximum ex ea sentiunt proventum. Asperi caules, & quadranguli, longi,
aparinæ non dissimiles, robustiores, & multo profus maiores; foliis per intervalla circum articulos,
scellatim decussatis. Semen eius rotundum, inter initia viride, mox rubrum, postea cum ematuruit,
nigrum: radix tenuis, longa, rubra. Vrinam ciet: qua de causa regio morbo opitulatur, pota cum a-
qua mulsâ: item ischiadicis, & resolutis. Crassam, copiosamq; urinam pellit, nonnunquam & sangui-
nâ: bibentes tamen quotidie lauari oportet, { & excrementorû quæ redditur differentiâ spectare. }
Aduersus serpentium morsus, ramulos cum foliis vino bibere prodest. Semen ex aceto potum, lienē
ablumit. Imposita radix trahit partus, menses, secundasq; . albæ utiligini illita ex aceto medetur.

Conclusa in
meo exempla
ri desunt.

Rubia,

RUBIA SATIVA.



Rubia, quam Græci, Erythrodonum dicunt, duum est generum, alterum Agreste, & sponte nascens: Alterum domesticum, folijs maioribus, & longioribus, & crassioribusque caulibus. Hæreticis Rubia nullis non cognita: neque medicis solum, ac sepalsarijs cognoscitur: sed etiam mulierculis, ac rusticis, ijs præsertim, qui in locis habitant, ubi lanificio opera impenditur. quandoquidem inficiendis tingendisque lanis aptissima est. Quæ propter rusticis, & agrestes mulieres; quod lanarum insectores Rubie quotannis plurimum emant, huius radices effodiunt, & venant. unde tantum quasius faciunt, ut sibi suisque victum suppédarent. Mittit hæc abunde Hetruria, præcipue Senensis ager. Experturimè folia noxiosibus mulieribus, quod asperissima sint, ad stannea vasa detergenda: siquidem micam dicitur quam pulcherrimè nirescant, que Rubiam fuerint experta. De ea autem differens Plinius libro 19. cap. 3. In primis, inquit, Rubia tingendis lanis, & corys necessaria. Laudatissima Italica, & maximè suburbana, & omnes panè pronitius secatent ea. Sponte provenit, feriturque similitudine erulia: Verùm spinosior ei caulis, genicularisque hic est, quinis circa articulis in orbè folijs. Semen eius rubrum est. Invenio apud quosdam morbum regium sanari hoc fructe, etiam si adalligatus spectetur tantum. Rubie meminit Galenus libro 6. simplicium medicamentorum, ubi sic scribit. Est autem Rubia tinctorum radix acerba, & gustu amara. Itaque quæcunque agere dicitur in superiore libro, ubi in unum eiusmodi cõmunit facultates,

Rubiz cõfid.

Rubiz virce ex Gal.



facultates, ea omnia in hac radice luculenter conspicies. Quippe cum & liemem, & iecur expurget, & urinas crassas, multasque, ac nonnunquam etiam sanguinolentas vacuet. Quin & menses ciet, ac medioriter que extensionem postulant, extergit: proinde vitiligines albas cum aceto illitrimat. Sunt qui eam ischiadicis, hoc est, coxendicis doloribus afflictiis, & resolutis, in potu cum melicrato exhibeant. Id ἑρυθροδανόν Græcè dicitur, quod Erythrodanum, & Rubia Latine: Paine, Fue alfabagin, Arabicè: Erythrodamo, & Rubbia, Italicè: Ferberroet, Germanicè: Runia, Hispanicè: Garance, Gallicè.

Ἀρχαίως.


LONCHITIS.

CAP. CXLIIII.

Cælestis mei
exemplar nō
habet, sed mei
habet, & pro
ficientibus le
git. ἑρυθροδανόν
i. humecis.

Lonchitis folia habet porri, latiora, rubentia, plurima, ad radicem circumfracta, veluti in terram procumbentia, pauca in caule: in quo flores, ceu galericuli, hiantibus comicis personis similes, nigri, & è rictu albam exerentes velut linguam, quæ ad labrum inferius spectet, semen in uolucris clausum lanceæ simile, triangulum: unde sibi cognomentum arrogauit. radix dauci. † Nascitur in siccitibus, & asperis. ‡ Radix ex uino pota urinam ciet.

LONCHITIS ASPERA MAIOR.



Ἀσπὴρ ἰσὶς ἰσὶς.

LONCHITIS ALTERA.


CAP. CXLV.

Altera est Lonchitis, quam aliqui asperam lonchitim dicunt: folia scolopendrii emittit, sed asperiora, maioraque, ac multo magis diuisa. Vulneribus mirum in modum prodest, in cisque in inflammationes excitari non patitur. Pota ex aceto lienum absumit.

Et si in compluribus Italiae, ac Germania montibus, alijsq; asperis, & aridis locis diu multumq; perquisierim primum Lonchitidis genus: ipsum tamen haecenus mihi non licuit reperire, neque etiam ab alijs inuentum videre. Ceteram aspera lonchitis, de qua cum Bartholomeo à Maranta Venetino iam dudum mihi longa fuit contentio, folio est Scolopendrii proximo, longiore tamen, ac magis diuiso, & ad polypodii faciem potius accedente, spithame longitudine, utrinque disparibus incisuris dissecto, venibus, aculeatisq; denticulis serrato, & ubique aspero, unde illi nomen. Caulem nullum profert, neque flores, neque semen, quemadmodum polypodium, & asplenium, eorum imaginem refert. Radice ni-

Lonchitis 65
sideratio.

LONCHITIS ASPERA MINOR.




itur multiplici, tenui, subrubricante perinde ac in Thylliri. In Italia quibusdam tantum nascitur locis usq; humectis, ac
 pliginosis: sed alibi nusquam a me usq; est. Duo eius vidimus genera. Maius quod ad me primum misit vir clarissimus Lu-
 cas Ghinus: & minus, quod à Iacobo Antonio Cortyso Patavino sum consequutus; in quo nihil desiderari potest. Est
 quoque altera planta, quam Maranta asperam Lonchitem esse legitimum contendebat, quam nos PSEVDOLONCHITIM
 vocamus, cum iam Maranta opinione à nobis adeo firmis rationibus sit explosa, ut nihil profus illi sit ar-
 gumentireliquum, quo se tueri possit. Qui rem omnem audire cupiunt, legant Epistolam nostras medicinales. De prima
 Lonchitide differunt Plinius libro 25. cap. 11. ubi sic inquit. Lonchitis non, ut plerique existimaverunt, eadem est, que
 xylion, aut phaliganion, quanquam cuspidi similis semine. Habet enim folia porri rubentia ad radicem, & plura quam
 in caule, capitula personis comicis similia, partium exerentibus linguam, radicibus prelongis. nascitur in silientibus.
 Hactenus Plinius, qui horum pleraque à Dioscoride mutuatus est. Lonchitidis virtusque meminit Galenus libro 8. sim-
 plicium medicamentorum, ubi de earum virtutibus ita scribit. Lonchitis, eius videlicet, que semen habet triangulare, fi-
 gura lancee simile, radix potissimum quodammodo similis est radici dauci: proinde vimam ciet. Porro eius, que scolo-
 penerie similia habet folia, ea ad glutinanda vulnera idonea sunt viridia, sed sicca cum aceto pota, henes induratos sanat.
 Nomina, Ἀρχίτις ut Græcis, ita etiam Lonchitis Latinis, & Lonchite Italis vocatur.

Lonchitidis
 vires ex Gal.

Nomina,

PSEVDOLONCHITIS ASPERA.




Althea.

ALTHAEA.

CAP. CXLVI.

60 **A**lthæa, quam alij Ibiſicum uocant, in ſylueſtrium maluarum genere eſt, cui folia ut cyclamino rotunda, lanugine caneſcunt: flor. roſaceo ꝑ: bicubitali caule: radice lenta, intrus alba. Althæa appellatur, quòd inter primas ſit utilis, & pluribus polleat remedijs. Decocta enim in uino aut aqua muſſa, & per ſe cum imponitur ruſa, efficax eſt contra vulnera: item ad ſtrumas, parotidas, abſceſſus, mammarum inflammationes, fracta ſedis, inflationes, neruorum rigores: ſiquidem diſcutit, & excoquit. rumpit, & ad cicatricem perducit. Cocta, ut dictum eſt, adiecto ſuillo adipe, aut anſerino, te rebinthinave, ut malagmaris lentor fiat, faciet ad vuluæ inflammationes, præcluſioneſque, in peſſis ſubdita. Decoctum eodem fungitur munere: onera uulvæ, reliquiasque à partu extrahit. Decoctæ radicis ſuccus ex uino porus, ſuccurrit urine difficultati, calculoſorum cruditatibus, dyſentericis, iſchiadicis, tremulis, ruptis. dentium mulcet dolorem, cum aceto decocta, colluto inde ore. Viri- de ſemen ſiccumque tritum, vitilignes in ſole cum aceto peruncas emendat. Eodem cum oleo & ace-

† Orb. legit
 ἰβικόν. ἰ.
 t. cuſtali.
 meum verò
 exemplar legit.
 ἰβικόν. ἰ.
 bitalem.




to peruncti, a venenatis non feriuntur. valet contra dysenteriam, & sanguinis reiectiones, aluid; profuuium. In posca; aut vino decoctum bibitur, contra omnes vesparum, apum, similibusq; aculeatos ictus. Foliorum olei momento, moribus, & igni ambustus illinuntur. Constat aquam, trita radice 60 addita, sub diuo addentari.

Althaeae confideratio.

Althaea a Latinis postea Medica simpliciter dicitur, quoniam ab *Althais*, quod Graecis mederi significat, erymon habere videtur. Quae circa merito scriptum reliquit Dioscorides, Altheam id nomen traxisse à multitudine remediorum, & frequenti eius vsu. Et vulgaris herba est, nullisque non cognita. Latini hanc Ibisicum nominant. Italis vero, corrupta a Latinis appellatione, & praeposita malua, quod cum ea quandam habeat cognationem, composito nomine Maluaibiscum vulgo vocatur. Althaeam memoris prodidit Theophrastus lib. 9. cap. 19. de plantarum historia, ubi de ea dicitur vs verbis. Et radicem Ibisici aquam posse addensare aiunt, si tritam inieceris, sub diuoq; huiusmodi potueris. Constat Ibisicum folio malua mauri, pilosiorique: caule molli: flore luteo: radice nervosa, alba: fructu malua. caulibus quoque gustu maluaem reddit. Vfus eius ad rupta, & tusses è vino dulci, & ad vlcera in oleo. Aliam quandam si caribus coquas, ut

In lib. tertium Dioscoridis.
 ALTHAEA ALTERA, SIVE ABVTILON AVICENNAE.



eoque, in idem aggregare, ac veluti conglutinare posse affirmant: alias vim attractoriam possidere, modo magnetis lapidis, atque succini. hæc in inanimatis. hætenus Theophrastus. Atego flore luteo me nunquam Althæam vidisse recorder. Rosæo flore facit eam Dioscorides. verum coloris non meminit. Est & planta, quam quidam Althæam alteram Theophrasti, quidam verò ABVTILON, Avicennæ esse censent. Atqui nos neque his, neque illis subscribimus. cum neque vini, neque alteri (quantum mea fert opinio) correspondeat. Verùm non ob id prætermittere libuit, quin eius hic imaginem adderemus, ut etiam aliorum iudicium esse possit, & ut eius quoque innotescat facultas. Siquidem experimento constat semine epoto sesquidrachma pondere ex vino, calculos in venibus frangi educiq; Urinas ejici, & dolores finiri. Meminit Ibisii Galenus libro 6. simpl. medic. ubi eius vires ita descripsit. Ebisicus, sive althæa (est autem malva agrestis) facultat: m habet digerendi, laxandi, phlegmonis leuandi, mitigandi, concoquendi difficiilia cætu tubercula. Radix porro eius, & semen cætera quædam similiter agunt, ut herba pyralis, seu tenuiorum partium, magisq; exicatoriam, ad hæc magis exterioriam quàm illa facultatena essendunt, ut & virgines detragant, & semen renium calculos confringat. Radicis verò decoctum dysenteris, alii in fluxu, & sanguinis reiectioni virile est, nempe cum adhi ingentem quandam facu:atem possideat. Planta que Grecis ἄλθα ἄγρια, ἰσθρα, & ἰθρα, Latinis Althæa, Ibisicus, seu Ebisicus nomen atur: Maritanis, Chitini, Charlmi, sive Chathmie, & Rosa rauen: Italis, Malvausico: Germanis, Ibisch, & Heylunitz: Hispanis, Hierua cananera, & Marmajie: Gallis, Guimauues.

Althæa vires
 ex Gal.

Nomina.

ALCEA.



Alcea. ALCEA.

CAP. CXLVII.

Alcea syluestrium maluarum generi assignatur. folia habet diuisa, verbenacæ proxima: caules tres aut quatuor cortice cannabino vestitos: florem rosæ, paruum: radices albas, latas, quinque aut sex, cum plurimum cubitales. Quæ cum vino, aut aqua potæ, dyfentericis, ruptisq; medentur.

Alcea confi-
derano.

Alceam hodie passim serè in Italia aliqui Bismaluam alij Maluam, syluestrem, nonnulli etiam Maluaniscum agreste nominant. Herba est caule, floribus, ac femine hortensi malæ perquam similis, sed folijs longiori incisura laciniatis. Alceæ radicibus non desunt, qui albes loco videntur, cum huius copiam non habeant, ad tumores tum soluendos, tum emolliendos. Alceæ historiam scribit Plinius libro 27. cap. 4. in qua adeo cum Dioscoride concordat, ut ex eo historiam retam transcripisse videatur. Peculiariter autem Alceam prætulit ad spasmodicos, tremulos, & Opisthotonos, ubi eius radix ex mulsâ propinetur. quin etiam impostam ad collectiones discutiedis commendauit. Porro Alceæ peculiari capite

liari capite meminisse Galenum non reperio, nisi hanc sylvestrem malvam appellauerit, dum malus facultates libro 7. simplicium medicamentorum describit, his verbis. Malua sylvestris quidem digerentis paululum, & emollientis leuiter est facultatis. Hortensis uero quanto plus habet aqueæ humiditatis, tanto facultate imbecillior est. Fructus eius tanto ualidior est, quanto & sicior. hæc Galenus. Ceterum Paulus seorsum Alceam retulit libro 7. ubi sic inquit. Alcea sylvestris malus genus est. In uino pota dysenteria, & erosionibus medetur, potissimum eius radix. Huic herbe nomen Græcum, *Αλκία*: Latinum, *Alcea*: Italicum, *Bismalua*, *Malua saluatica*, & *Bacon uischio*: Germanicum, *Signars kraut*: Hispanicum, *Malua de Vngra*, & *Malua montesina*: Gallicum, *Bimaue*.

Alceæ uires
ex Paulo.
Nomina.

Kanebis.

CANNABIS.

CAP. CXLVIII.

10 **C**annabis fatiua planta magni in uita usus ad robustissimos funes factitandos: foliis fraxini, graui odore: caulibus proceris, inanibus: femine rotundo. quod largiore cibo genituram extinguit. Succus ex ea recente conuenienter aurium doloribus instillatur. Sylvestris cannabis uirgas fert althææ similes, minores, nigriores, & asperiores, cubiti altitudinem æquantes: folio fatiua, nigriore, &

CANNABIS.



asperiore: flore lychnidis, subrubro: femine, & radice althæa: Deposta radix, illitu inflammationes mulcet, tumores discutit, rufos articuloꝝ dissipat. Huius cortex torquedis funibus accomodatus.

Cannabis c6.
fideiatio.

Cannabis sativa planta est ad eod̄ vulgaris notitia apud omnes Europe nationes, ut omnino superuacuum sit eius faciem uerbis repræsentare. Quæ etsi uulgaris aacmodum sit planta, est tamen magni in hominum vita usus, non solum ad uolubilissimos sumes parandos, quibus in fabricis magnis ad subsistenda, trahendaq; ingertia pondera, & nauigia regenda utimur, sed etiam ad lintea copulanda, & quibus infima plebecula indumenta, aliaq; multa sibi parat: Inuisa tamen furibus, & latronibus, quod cannabis tanta aduersus eos sit facultas, ut non solum huic plantæ adalligati sua ipsorum malefacta detegant, & ut e proprio patefaciant, sed quod etiam subinde sonante cannabinâ affecti, suffocentur penduli. Et simplici adolefcit caule, sed in marem & feminam distinguitur. Mas plures è caule surunt ramos, arbuscula speciem 10 referens; ad eod̄ ut non desint, qui è stipite carbones faciant, ad bombardarum puluerem parandam. Femina longè tenuiores caules edit, nullis ramis brachiatos, nulloq; semine prolifcat, folia utriusque fixa, sed minora, & graciliora, sensimq; serrata, atque in mari maiora spectantur, & nigriora quinq; senape ex uno pediculo procedunt. Radice nititur unica, sed fibrosa. Syluestrem autem quamquam à multis in Italia provenire dicunt; paucos tamen esse puti, qui legitimum ostendant. Mihi certe hæc uisum legitimum uidere non licuit. Ceterum sativæ semen in cibis sumptum planè contrarium efficit in gallinis, & in nobis: siquidem largius commanucatum nobis genituram extinguit; gallinas verò ouiferaciorum reddit. Experientia enim comperit habeo, gallinas, quæ hyeme, quo tempore algeris scuitia raro qua parere solent, Cannabis semine resuscitantur, numerosiore ouorum partu gaudere: id quod frequenti cantu suo declarant. Illud præterea mihi non abierit iudicium, quod Cannabis receptis decoctum, expressa oleum feritur herba, terrefrimum humbricorum cauernulis inspersum, statim eos euocat. Quod piscatoribus acceptum referendum est, qui hoc ingenio vermiculos 20 capiunt suis hamis insidens. Per eum non modo terenos vermes euocat Cannabis decoctum, & succus eius expressus, sed etiam (ut Plinius libro 20. cap. 23. auctor est) vermiculos, & quodcumque animal in aere intrauerit, eicit. Hinc itaque quispiam conijcere potest, eius facultatem ad interanorum vermes haud imbecilem fore. Cannabis decoctum auxiliatur solus iumentorum aluo, quod coagulandi vim habeat. Quinimò non desunt, qui foliorum puluerem dysentericis propinent. Radix in aqua decocta, & illita contractos articulos emollit, item podagras, & similes articuloꝝ impetus. Ambustis quoque recens, mihi iterum, sed sepius amouenda, & iterum amouenda est, ne excidetur. Id præstabit commodius, si recens in mortario tundatur cum recenti butyro, & subinde applicetur. Equorum timeas, quæ intra sedem hærent, succus, aut decoctum infusum eicit. Cannabis meminit Galenus libro 7. simplicium medicamentorum, sic inquiring. Cannabis semen statim discutit, adeoque desiccatur, ut si plusculum edatur, genituram excitet. Sunt qui ex eo viridi succum exprimentes ad aurium dolores ad obstructione, ut mihi videtur, natos videntur. Et libro primo de alimentorum facultatibus, idem de Cannabi ita scribit. Non quemadmodum planta ipsa cannabis vitici quemadmodum est similitis, ita semen femini facultate est simile: sed plurimum ab eo distat, ut quod concoctum est difficile, stomachoq; ac capiti nocet, prauitque sit succi. Sunt tamen qui eo quoque frizo cum alijs tragematibus rescantur. Tragemata autem trica ea, quæ post cenam, voluptatis inter bibendum excitande gratia mandantur. Multum autem calefacit: ideòq; sumptum paulo largius caput ferit, vaporem sursum ad ipsum mittens, calidum simul ac medicamentesum. hæc Galenus. Ex quibus liquido apparet, quam grauiter errent mulieres, & præsertim in Germania, quæ pueris comitiali morbo laborantibus Cannabini feminis decoctum exhibent. quo tantum abest, ut morbum curent, ut etiam eius augendi occasinem præbeant. Quæ planta a uerbis Græcè, Cannabis item Latine dicitur: Arabicè, Schehedeneq; & Canab; Italicè, Canape; Germanicè, Zamer harff; Hispanicè, Canhamo; Gallicè, Chanvre.

Cannabis v1
res ex Gal.


Mulierum
error.
Nomen.

ΑΝΑΓΥΡΙΣ. ANAGYRIS.

CAP. CXLIX.

Anagyris frutex est arboris instar, perquam grauis odore: foliis viticis, uirgisdq; flore brassicæ: semen in corniculis non breuibus gignit, subrorundum, fitumum, uersicolore facie, simile renibus, quod durefcit uua maturefcente. Tenera folia trita tumores illitu reprimunt: si partus hæreat, & secundæ, mensesque moventur, drachmæ pondere bibuntur in passo: sic & suspensiofis dantur, & contra capitis dolores in uino. difficulter parientibus adalligantur, ita ut a partu statim auferantur. Radicis cortex concoquendis, discutiendisq; adhibetur. Semen commanucatum uomitiones uehementer ciet:

ANAGYRIS.



Quanis veteres vnius tantam Anagyris meminere; quo tamen in Italia visentis genera. Maius in Apulia frequentissimum nascitur, & eo Campania tractu, quo Terracina inter Pyrrheni litus: folijs vitici proxima flore brassica racemosa: fructu botentis similis similis, amplioribus tamen, & brevioribus, paulo siliquis inclusis, colore purpurascete, usque adeo duro, ut aqua macerato, sua in pernici duritie consistat. Mius, quod vna Tridentina vulgo vocant Egbelo, natio & iunio mensibus grato in montibus spectaculo flores. Micat enim aureo flore, alteri omnino simili, odore tamen ingrato. Hinc cornicula prodeunt genisla amula: in quibus semen continetur eiusdem genislae magnitudine, sed oblongum, phaseoli modo, colore subnigro. Quod comedentes quandoque ignari pastores, veluti legumina, crebris adeo vomitionibus afficiuntur, ut nonnunquam viderim ego quosdam, qui sanguinem usque eucuerunt. Materies ligni durissima, que gnaiei modo exterius lutea est, interius vero nigra. Incorporata ad durat: proinde vittores ex Anagyris palos facti sunt sustinendis vitibus aptissimos, bosq; ceteris preferunt ex alijs arboribus factis. Quin & sagittarij ex ea validissimos arcus faciunt. Hac planta scaturit vallis Anania, ac vniuersus Tridentinus ager. Ceterum non desunt et recentioribus herbarijs haud obsecuti nominis (quorum opinionem tuetur Conradus Gesnerus Tigurinus vir magna lectio- nis in suo libro animalibus dicato) qui putant, ac potius pro certo affirmant, alterum Anagyris genus, quod in montibus Tridentinis vulgari sermone Egbelo appellari supra diximus, eam sine controversia arborem esse, quam Plinius libro 16.

Anagyris ef-
fasciatio.

Opinio re-
pota.

ANAGYRIS ALTERA.



cap. 18. Laburnum vocat, vbi ita scribit. *Aquas odere cupressi, inglander, castaneae, laburnum. Alpina & haec arbor, nec vulgò nota: dura ac candida materie: cuius florem cubitalem longitudine apes non attingunt. Ex ijs Plinij verbis abundè, ni fallor, cognoscitur, quòd ut falsa, reprobanda sit illorum opinio. Siquidem Laburni materies à Plinio candida describitur: non contrà medullitis nigra, corticetennis lutea, in modum Guaiaci, qualis Egheli uocata materies planè cernitur. Præterea eghelus arbor est omnibus ferè cognita, quòd frequentissima in syluis reperitur: non ea quidem vulgò incognita, ut de Laburno refert Plinius. Ad hæc Egheli flores, qui in arbore racemorum instar pendent, palami longitudinem non excedunt: quos tamen Laburno Plinius cubitales reddidit. Illud insuper experientia compertum habeo: etsi contrarium asserat Gesnerus quòd apes Egheli flores attingunt, nec eos aspernantur. Hæc nimirum sunt, quæ magna sit differentia inter Laburnum & Eghelum. Hanc tamen plantam idem Gesnerus montani cythisi genus esse censet, quæ tamen quòd folia ferat: terna ueluti cythisi, quoad; cythisi modo sit apibus ingrata. Sed is (pæce viri eruditii dixerim) in hoc maxime hallucinavit: deprehenditur, Marci Parronis, Columella, & Plinii testimonio: ut qui inter cætera feri uideant iuxta alucaria cythijum, quòd huius flore magnopere delectentur & alliciantur apes. Hoc similiter testatur Galenus p̄o primo de antidotis, ubi cythisi historiam & vires describit. Et mirè certè, Gesnerum illa non uidisse, quæ tamen de-
buerat,*

hucrat, si omnes, qui extant in Europa, libros perlegit, ut perlegisse conicitur ex Bibliotheca, quam edidit. Quare equidem non possum non in ea perflare sententia, quam iam pridem habui de planta Eghelo uocata, cum nulla sit firma ratio, quae me cogat illorum subscribere iudicio, qui eam Laburnum Plinij esse existimant. Quantum igitur ego sentio, Eghelus erit Anagyris minor, aut Anagyris montana, si ita nobis liceat eam nominare. Namque non solum folijs, floribus, corniculis, semine & omnibus denique notis Anagyris profusè emulatur, ut eius effigies, quam hic danus, pulchre demonstrat; sed etiam uiribus & odore, utpote qui in tota planta reter & grauis admodum sentiat. Anagyris uires memoria prodidit Galenus libro 6. simplicium medicamentorum, his uerbis. Anagyris frutex est grauior olens, & acris, digestis, excalescentisq; facultatis. Sed folia etiamnum uirentia, cum propter humiditatis admissionem minus sint acris, idcirco tumentia reprimunt. At si siccatu incidentis sunt, exiccantisq; valenter facultatis. Similem fere facultatem habet radice eius cortex. Semen autem magis subtili non est partium: sed & uomitum prouocat. Planta quae ἀνάγρις Graecis, Anagyris etiam Latinis dicitur: Anagiri, Italis.

Anagyris vires ex Gal.
Nomina.

C E P A E A.



Ἐπερα.

CEPÆA.

CAP. CL.

Ἐπερα portulacæ similis est, sed nigriora habet folia, & radicem tenuem. Folia in uino pota vrinæ stillicidio, & vesicæ scabiæ laborantibus opitulatur. maximè id præstat, si cum decocto radicum asparagi eius, quem myacanthon, hoc est, corrudam uocant, bibatur.

Cepæe consideratio.

Cepæam, quam antea in nostris comentarijs Italica lingua conscriptis, ingenue confessus eram me nondum compertisse, aut ab alijs compertam vidisse, hoc tempore Venetijs ad me uenit Ioannes Odoricus Melchiorius Tridacuinus medicus pro ætate sua non imperitus, reiq; herbariæ non ignarus, mei adeo studiosus, ut si aliud non esset, hoc nomine tantum mihi plurimum diligendus sit, atque etiam in filium habendus. Ad Cepæam hanc redeo. Ea sanè mihi uisa est ita admissim Dioscoridis descriptioni responderè (id quod eius pictura, quam hic damus, graphicè ostendit) ut non dubitandum putem, quin hæc sit uera ac legitima Cepæa. Huius, quod equidem legerim, Galenus non meminit in simplicium censu. Veruntamen Paulus eius mentionem fecit libro 7. inter simplicia, ubi eam retulit his uerbis. Cepæa portulacæ similis est. Folia ipsius contra vesicæ scabiæ uulnere bibuntur. Radix cum asparago, quem myacanthinum, hoc est, corrudam appellant, pota, urinæ stillicidia, quæ ex obstructione fiunt, abigit. Ἐπερα ut Grecis, ita Cepæa Latinis, & Cepea Italianis appellatur.

Cepæe vires ex Paulo.

Nomina.

ALISMA.



Αλισμα.

ALISMA.

CAP. CLI.

Alisma, alii Damafonion appellant: folia ei plantaginis, nisi angustiora essent, † laciniosa, con-
 nexaque in terram: caule simplici, tenui, cubito altiore: capitibus thyrsi: flore tenui, candido,
 † palliescente: radicibus renubus, ut veratri nigri, acribus, odoratis, modicè pinguibus. † aquosus
 amat tractus. Radix, si drachma vna, aut altera bibatur, his conuenit^a, qui leporem marium de-
 uorant, aut à rubetis ranis demorsis sunt, aut opium hauserunt: torminibus, atque dylenicæ, per-
 se, aut cum pari modo^b feminis dauci, potui datur, conuulsis, & contra uitia uulua prodest. Herba
 30 sifit aluum, menstrua pellit, tumores illita mitigat.

C6dusa met
 exemplar n6
 hater, nec
 Orib. legit.
 a. apud vtrū
 maxime C6dusa
 crederetur rā
 epūvov. i. i. iis
 qui lepori vo-
 rant, vel ran-
 nam rubra.
 b. Meū. quā
 tra d'auco. i.
 cum pari dau
 co.
 Alismatis
 confidit.

Quanquam affirmat Ruellius, cui etiam Fuchsius subscribere videtur, *Alisma* sibi cognitum esse, vocariq̄ue a nonnu-
 lis Pastorem fistulam, à quibusdam verò Plantaginem aquaticam, tamen plantago hæc, quam etiam aliqui Bar-
 bam syluanam appellant, nullis notis cum *Alismate* conuenire deprehenditur. Siquidem *Alisma* folia fert plantagini simili-
 lia, sed angustiora, & in terram reflexa: caulem mittit simplicem, ac tenuem. Plantago autem aquatica folijs prodit
 plantagine maioribus, lancearum cuspis inftar acuminatis, sussumq̄; spectantibus; multiplici caule, adnatis pluribus
 referto. Cum itaque ex his notis collatis consistet, *Alisma*, & *Barbam* syluanam inter se plurimum differre, non temerè fa-
 cere videor, quod illorum sententia non ausim adstipulari. Porò plantam, quam hic pro *Alismate* depingi curauimus,
 30 mihi primùm Præge ostendit Adamus Leonorus, iuuenis spectate doctrina, & rei herbarie studiosus. Quod enim hæc
 pluribus, ni fallor, notis *Alisma* representet, merito fit: vt iam non dubitem affirmare eam esse legitimum *Alisma* aut genu-
 inum *Alismatis*: quæ re non pignit eius effigiem exhibere, vt aliorum quoque de ea sit iudicium. præstat ad ea omnia, ad quæ
 valere *alisma* tradidit Dioscorides, quo fit vt hæc planta *Alisma* mihi perpetuò expleat, quousque alia mihi sese offerat,
 quæ certioribus notis Damafonion (ita enim quibusdam *Alisma* vocatur) referat. Ceterum duo *Alismatis* genera Plini-
 us constituit libro 25. cap. 10. vbi de vtroque disserit his verbis. *Alisma* inquit, alij damafonion, alij lycin appellant. folia
 ei plantaginis, nisi angustiora essent, & magis laciniosa, conuexaque in terram, alij etiam venosia similitur: caule sim-
 plici, & tenui, cubitali capite thyrsi: radicibus densis, renubus, vt veratri nigri, acribus, odoratis, pinguibus. nascitur
 30 in aquosis. Alterum genus eiusdem in syluis, nigrius, maioribus folijs. hæc Plinius. *Alisma* memorie prædidit Ga-
 lenus libro 6. simplicium medicamentorum, sic de eius viribus differens. Damafonion, aut *Alisma*. De hac herba in
 tertio libro tradit Dioscorides, quod radix eius epota dysenterias sanat & aluum sifit, atque œdemata mitiget. Sed
 nos ea quidem experti non sumus. Quod autem constitutos in renibus calculos aqua, in qua decocta fuerit, pota commi-
 nuat, casu experti sumus. Ex quo liquet, quod absterforiam quandam facultatem obtinet. Huius herbae nomen Grae-
 cum Ἀλισμα: Latinum, pariter & Italicum, *Alisma*.

Alismatis vi-
 res ex Gal.

Nomina.

† Hæc vox non legitur in Graecis codicibus, neque ab Oribasio refertur, neque etiam à Marcello peritur. Vnde pla-
 nēd suspicor, quod Ruellius ita verbum hoc ex Plinio adiecit, vt reliqua etiam ex eodem reddidit.

Ὀνοβρυχίς.

ONOBRYCHIS.

CAP. CLII.

40

Onobrychis folia habet lentis, longiora paulò: caulem dodrantalem: florem puniceum: radicem
 paruum, nascitur in vlginosis, & incultis. Herba suapte ui, si trita illinatur, tubercula dissipat: cum
 uino pota, strangurias sanat: illita ex oleo, sudores mouet.

Nascitur Onobrychis, Plinio libro 24. cap. 16. auctore, circa fontes. Folia habet lentis, paulò longiora: florem
 rubentem: radicem exiguam, & gracilem. Sunt qui Onobrychin velint eam esse herbam, quam aliqui Rutam ca-
 prariam, alij Galegam uocant: nos verò vulgò Lauanese. Verùm hæc notis, quæ Onobrychi tribuuntur, baudquaquam
 respondere deprehenditur, quippe quæ folia ferat lentis quadruplo maiora, caulem plerumque bicubitalem, flores purpureos,
 & radicem non paruum. Vt hinc mihi planè videatur, quod illorum opinioni nemo rectè possit, aut debeat adstipulari.
 50 Onobrychidis vires tradidit Galenus libro 8. simplicium medicamentorum, sic inquires. Onobrychis resfaciendâ, dige-
 rendiq̄ vim obtinet: prouide folia eius virentis etiãmm illita ad morem cataplasmatis tubercula dissipant: creta
 Etæ verò, si cum vino bibantur, strangurias sanant. Quinetiam sudores elici cum oleo iuncta. Quæ Ὀνοβρυχίς Graecè,
 Onobrychis item Latine, & Onobrychi Italicè vocatur.

Onobrychis
 confidit.

Onobrychis
 vires ex Gal.

Nomina.

HYPERICVM,



Ἱπέρικον, HYPERICVM.

CAP. CLIII.

a Meſi exēpl.
 Ἱπέρικον ἁγίου
 ἵωαν. ἱπέρικον
 ἁγίου.

Hypericum alij androsæmon, alij corion, alij chamæpityn appellant, quoniam semen odore ^{re-} 10
 sinam imitatur: furculaceo frutice, dodrantali, rubefcente: folio rutæ: flore luteo, † leucio si-
 mili, † qui digitis attritus sanguineum remittit, qua ex causa androsæmon cognominatur: † sub-
 hirsuta siliqua, & in rotundo oblonga, hordei magnitudine: semine intrus nigro, resinosi odoris. gi-
 gnitur in locis cultis, & asperis. Vrinam cit, menstrua pellit appositum: tertianis, quartanisque cum
 vino potum liberat. Semen quadraginta diebus haustum, ischiadicis medetur. Folia cum semine il-
 lita, ambusta sanant.

ASCYRVM.



60

Ascyron.

ASCYRVM.

CAP. CLIIII.

Ascyron, siue ascyroides, hyperici genus est, magnitudine distans, fruticosus, maiores habens ramos, surculosifloros, rubentesque; folia tenuia; flores luteos, & fructum resinofum, hyperico non abfimilem: cuius attritu digiti ferè cruentantur, qua de causa androsæmon vocauer. Vius se minis ad ischiadicos, potum in hydromelitis sextario: nam biliosa recrementa amplissimè detrahit, sed assiduè dare oportet, donec sanitati restituantur. Illinitur & ambustis efficaciter.

ANDROSAEMON.



Ανδρόσαμον.

ANDROSAEMON.

CAP. CLV.

60

† *Androsaemon* ab hyperico, ascyroque differt, quod fruticet, ramulis surculosis, ac tenuibus: † rubentibus uirgis, & folijs rutæ, triplo { aut quadruplo } maioribus, quæ trita uinoso succo manant. complures alas habet in cacumine, vtrinque expansas, pinnatasque: circa quas flores pusilli, lutei: & in calyculis semen papaueris nigri, insignis lineis. Huius comæ trita resinofum odorem reddet: sed à purgatione aquam exorberet oportet. Herba ambustis illita medetur, & sanguinem cohibet.

C O R I S.



Köpp.

CORIS.

CAP. CLVI.

60 **C**oris, quod aliqui hypericon uocant, frutex est folio ericæ, rubro pinguiore, ac minore, non altior dodrante ^a, inuis, odoratus, acris. Potum semen menses trahit, & urinas: contra phalangiorum morfus, ischiadicos, & opisthotonicos ex uino potum auxilio est; horribus ex pipere, sed opisthotonicis ex oleo, aptissimè illinitur ^b. Radix uino decocta potaque, defectis operi ferre creditur: sed laborantem inter potandum quàm optimè cooperiri licet: siquidem corpustotum defudabit, ex qua re pristinam agilitatem recuperabit. †

^a *Erythraei*.
ori gratus. ita
mum.
^b Hæc omnia
in meo exem
plari non ha-
bentur.

Hypericum, *Asterum*, & *Androsænum*, eiusdem planæ generis plantæ (ut Dioscorides inquit) esse videntur. Verùm in *Hypericæ*, & *Asterum* aliqua notatur differentia; nam hæc folia habet rubentiora, illa uiridiora, uni maiora *disant*, alteri *minora*. Similis discriminis ratio in caulibus. Omnes hæc congeneres plantæ hodie ab omnibus uulgò cognoscuntur: ea nanque in iunio, & iunio mensibus, diuersis in locis aureis floribus ornata conspicuntur, & adamantissimè di-

Hypericæ, &
congenerum
conid.

similæ

finctis ac præditis notis, quæ singulis à Dioscoride tribuuntur. Ceterùm quæ Coris vocatur, non ita Hypericum refert, quemadmodum Androsæm, & Ascyrum. quippe quæ non alior' doctralanti altitudine affurgat: folijs erice, mino- ribus tamen, & subpinguibus: caulibus rufescentibus, odore suavi, ac grato. Hæc ad me pluries allata est à nostris her- baris, nascitur frequentissima in Italia. Hypericum a perforatis folijs à nostris vult Perforata vocatur: folia enim in- numeris scætant furaminibus, hucq; adeo minutis, ut visum effugiant, nisi ipsa folia Jole obiecta inspiciantur. Id quod si- lentio videtur involuisse Dioscorides: quæntiam Plinius, alioqui rerum omnium diligentissim' in- indagator. Qui tamen

Plinii lapsus.

hac in historia haud dubiè falli deprehenditur, quod scripsit libro 26. cap. 8. Hypericum nasci semine in silqua, nigro, maturæ ferre cum bordeo. Siquidem Dioscorides non trahit Hypericum cum bordeo mature ferre, sed contineri eum nigrum semen siliqua subhisita, & in rotunda oblonga, bordei magnitudine. Constat prætere æmnia experientia ma- turescere bordeum plerunq; æbente maio: verùm Hyperici semen non periscitur, nisi iulio, & augusti mensis s. In hac quoque Hyperici historia erret Brasavolus medicus licet clarissimus, quod velit Hypericum ex Dioscoridis auctoritate fore in album habere: eamq; ob causam, id quod circumfertur, eam flore sit melino, illegitimum esse putat; inò non aliud, quàm Rham sylvestrem, pro qua pharmacopolem secum colloquentem, id ipsum asseruere admonet. Neque in his uno tantum, sed, quantum sentio, duplici notatur errore. Primum quod Hypericum non album, sed luteum florem ferre scribat Dioscorides contra Brasavoli sententiam, cum sic in eo legatur *αἴμα ἴσχυον ἔχει, ἴσχυον ἔχει, ἴσχυον ἔχει* habens luteum, ferre scribat Dioscorides contra Brasavoli sententiam, cum sic in eo legatur *αἴμα ἴσχυον ἔχει, ἴσχυον ἔχει, ἴσχυον ἔχει* habens luteum, non autem album inquit, ut perperam Marcellus Florentinus interpretatur, cuius fortasse falsa interpretatio Brasavo- lum seductus est. Deinde quod legitimum Hypericum pro sylvestri ruta sermæmaxim censuerit, eam tamen in calce ferè sui voluminis prioris sententia obliuis, diem olei ex Hyperico parand' in iopyrosæ rationem explicat, communis usus Hypericum Ascyrum esse declarat. Nec secus quàm Brasavolus hallucinantur, pace eorum dixerim, Monachi illi reue- rendi, qui in Mestum comm' ententiam, cum sic in eo legatur *αἴμα ἴσχυον ἔχει, ἴσχυον ἔχει, ἴσχυον ἔχει* habens luteum, ferre scribat Dioscorides contra Brasavoli sententiam, cum sic in eo legatur *αἴμα ἴσχυον ἔχει, ἴσχυον ἔχει, ἴσχυον ἔχει* habens luteum, non autem album inquit, ut perperam Marcellus Florentinus interpretatur, cuius fortasse falsa interpretatio Brasavo- lum seductus est. Deinde quod legitimum Hypericum pro sylvestri ruta sermæmaxim censuerit, eam tamen in calce ferè sui voluminis prioris sententia obliuis, diem olei ex Hyperico parand' in iopyrosæ rationem explicat, communis usus Hypericum Ascyrum esse declarat. Nec secus quàm Brasavolus hallucinantur, pace eorum dixerim, Monachi illi reue- rendi, qui in Mestum comm' ententiam, cum sic in eo legatur *αἴμα ἴσχυον ἔχει, ἴσχυον ἔχει, ἴσχυον ἔχει* habens luteum, ferre scribat Dioscorides contra Brasavoli sententiam, cum sic in eo legatur *αἴμα ἴσχυον ἔχει, ἴσχυον ἔχει, ἴσχυον ἔχει* habens luteum, non autem album inquit, ut perperam Marcellus Florentinus interpretatur, cuius fortasse falsa interpretatio Brasavo- lum seductus est.

Monachori hallucinatio.

Quorum sententia cum fuerit à nobis superius in rutæ mentione rationibus & authoritatibus abundè explosa, & improbatâ. Spermæcum ei et idem nunc repetere: eò enim accedit, quæ p'nta horum errata cognoscere volet. Hyperico vis inest referand', resoluend', agglutinand', atque etiam cohibendi. Epotum semen ex vino calculus egit, & renis adueryatur: quæntiam venenosorum morsibus resisit, tum idem potum, tum herba ipsa decorata, hau- stæ, tum morsibus illa. Aqua stillantia florescentis iam herbe, maxime quibusdam præsertim, si poterit, comitali- bus, & resolutis. Datur feminis furina commoed' ex polygoni succo ad sanguinis reiectiones. Idem aluum exonerat. Inest floribus, & femini mira facultas ad vulnera omnia sananda, præter ea, quæ in capite sunt. Ideoque volem, in quo diu flores atque semine pregnantes siliquæ macerata fuerint, diuque insolate, mirificè recentia vulnera sanat. Sed per quam bellè id efficit, si cum laticæ, aut abiegne lachrymæ oleo miscetur. Idem per se ventri illitum, dysentericis iu- nat: potum verò coctæaris mensura lumbicos necat. Scripsere quidam Hypericum adeò distil' gnomes, ut eius s'istitu statim auident: quare quibusdam fuga dæmonum vocari capit. Hyperici vis memor' præcipit Galenus libro 8. Simp- plicium medicamentorum, sic inquit. Hypericum calefacit, & desiccet, tenuisque substantiæ est, adeò ut & menses, & primas promouet. Sed ad hæc totus sumendus est fructus, non tantum semen. Porò cum folijs illius viridis ad cicatri- cem dicit cum alia, tum etiam ambula. Ceterum si sicca confusa ins ergas, sanabis huncia, & putredine sicera. Sunt & qui ischiadicis bibendum exhibent. Idem libro 6. de Androsæmo ita scribit. Androsæmum plantâ fruticosa, natu- ra duplex: unum enim Ascyron, & Ascyroides nuncupatum est, species hyperici. Alterum verò a quibusdam Diony- sis appellatur. Est autem semen eorum purgatorium. Foliorum verò facultas modicè extergens & desiccans, et & ambusta sanare credantur. Ceterum in vino austero decocta, vinum ipsum magis autem vulnerum glutinaciorum efficit. Sed quod de Crimenionem fecerit Galenus in simplicium medicamentorum censu, nihil incomptum est. Planta, quæ Græcis *ἰσχυρόν* Latini similiter Hypericum nominatur: Mauritanis, Reiofrican, seu Reiofrican: Italis, Hyperico, & Perforata: Germanis, Sant Iobans kraut: Hispanis, Coraioncillo: Gallis, Milie peruis, & Trucheran. Quæ verò Græci *ἰσχυρόν*, Latini quoque Ascyrum dicunt: Arabes, Asbivach: Itali, Ascyro. Quæ deniq; Græcis *ἰσχυρόν* Arabesque *Ascyron* item Latini appellatur: Arabibus, Androsæmum, Androsæm, sive Androsægian: Italis, Androsæmo. Quæ denique Græcè, Coris etiam Latine, & Cori Italicè vocatur.

Hyperici vi- res ex Gal.

Nomina.

Quoniam hæc loco in vulgatis exemplaribus Græcis nulla fit albæ violæ mentio; idcirco sunt qui illorum testimonio fieri velint illud auferent ex interpretibus. Sed quomodo id rectè factum sit, non vidèo: siquidem in Orisiba legitur, *ἰσχυρόν λευκῶντιον*, hoc est, florem habens luteum leucoio similem. Adde etiam, quod Hypericum ita ada- muni. In storis color e luteam violam representant, ut nihil melius. Nos autem nisi sumus voce Græca, ne ex albo, quod- fuit Marcellio imposuit, aliqua possit oriri difficultas.


Quæ hic sequuntur, in Græcis codicibus impressis non hoc loco, sed in fine inter notæ, & Dioscoridis falsò adscri- pta leguntur, ut quæ adscritta sint habita. Nos verò illa hæc admittimus Ruellij, ut facilius, interpretationem secuti necnon etiam fidem codicis manscripiti.

Καυαυτίτις.

AIVGA.

CAP. CLVII.

Alga herba in terra repens, subcurua: folijs semperuiui minoris, multò tenuioribus, hirsutis, & pinguioribus, circum ramos frequentibus, odore suavis: flore tenui, luteo, vel candido: radici- bus cichorij. Folia septem diebus in uino pota regio morbo medentur: & quadraginta diebus ex hyromelote, ischiadicis sanant. Dantur peculiariter vrinæ difficultatibus, icterinis, & renum utriusq; torminolis profunt. Ea apud Heracleam Ponticam, perinde atque antidoto, contra æonitum utru- que tibi bentes decoctum. Ad antedicta illinitur, cum polenta iure decocti subacta. Trita in farinam, & cum fico in pilulis sumpta, aluum emolliit: excepta melle, cum æris squam, & resina dedit: apposi- ta ex melle, vulnè uitæ extrahit: mammarum duritias discutit: vulnera glutina: ulcera que serpunt, cum melle illita, cohibet. Alterum est genus aiugæ cubitalibus ramis, in anchoræ speciem incurua- tis, prætenuibus: coma supradictâ, flore candido, semine nigro, hæc etiam pinum redolet. Tertiâ mas nominatur, paruula, foliis exilibus, albis, scabris: caule aspero, candido: luteis stoculis, semi- ne iuxta alas, respit & hæc pinum. Hæc duæ uim superioris obtinent, sed non usq; adeo efficacènt.



Angam quam Graeci Chamæpitiu vocant, quoniam folijs, & odore pinum refert, herbariorum vulgus Iuam ar-
 thriticam appellat, quod ischiadicis, & alijs articolorum doloribus operam ferat non obscuram. Vulgaris est notitia
 Aiuæ, que primo generi adscribitur. Siquidem planta est am est per terram repens, folijs oblongis, angustis, rosmarino corona-
 rio proximis, minoribus tamen, mollioribus, & hirsuta canitie subalbicantibus, circa ramulos totos, qui tenues, & obsequiosi spe-
 ctantur, sese suspantibus, odore pinum, quemadmodum & facie referentibus, unde illi Pinus infima nomen. Flores edit aut eo ca-
 lore fulgentes in mureso ferè caule, sed tenues, & exiguos. Radicibus nititur palmaribus, pluribus adnatis fibris. Nasctitur te-
 nuis, ac arenoso solo, incultis praesertim locis, & in arvis nulla statione videntibus: sapore est amaro, non sine acredine quadam,
 que tamen ab amaritudine superatur. Ideoq; excaesfici, incidit, extenuat, abstergit, & expurgat. Verum postrema, quam se-
 nescimus etiam vidimus, non adeo omnibus est nota, quemadmodum nec media, quam haecenus mihi quidem videre non licuit. Cere-
 rim in aperta errore versabatur Germanus ille pharmacopola, qui Brasauolum docuit. Aiuam Germanica lingua vocari Ver-
 gils meia niche. Quandoquidem herba huius nominis mihi cum Germanis iandiu versanti notissima est: que tamen nulla pro-
 pter sumatur & resuscit ter ebrihims, sine Laricis quaternis drachmis, ischiadicis sanat. Eadem recens in aereo decoctio, & po-
 te emortuos fetus extrahit, murese plantae decoctum facit ad omnes cerebri, nervorum, & articolorum affectus a pituita pro-
 nentes, si pluribus propinetur diebus ex Rheodomelle, & oxymelite. Nam & comitiales, et reuelatos, & podagricos iuuat. Fit
 è floribus, & saccharo medicamentum: (officine conseruam vocat) ad paralyticos, quo qui videntur cum vesperi se euertunt re-
 cipiant,

Aiuæ confi-
 deratio.

Cuiusdã Ger-
 mani error.