




ENFER





- No Salau

varr.

El autor es D. José Severo López,  
Médico de cámara de Carlos IV,  
Catedrático de la Real Escuela  
de Medicina Práctica y Exami-  
nador del Proto medicato.

1754-1807. El apellido es  
LOPEZ PEREZ, José Severo

Tengo un folleto entera sobre él.

Ver: Anales de la Real Academia  
de Medicina, Marzo 1908.

5-55



Recopilacion de Doctrina  
Medica, segun el metodo de en-  
señar en el establecimiento de Cli-  
nica de Madrid, a cargo de D.<sup>no</sup>  
Jose Severo Lopez, Catedratico  
de el. Año de 1799. ~. ~.  
Enfermedades Mugeriles. ~.



## Enfermedades de Mujeres.

No hay diferencia alguna entre la inflamacion de Vterio en las Mujeres, y de otra qualquiera parte; sus enfermedades nerviosas son las mismas, y solo hay la variedad que son mucho mayores en estas que en el hombre, pero son tambien mucho mas pasajeras.

Tienen una facilidad muy grande para repararse de la sangre perdida; de donde se deve inferir que sus fuerzas digestivas, sus visceras quiloportecticas son muy fuertes, y tienen mas actividad q. las del hombre.

Estan por una ley constante su-



getas á la menstruacion, y de su mayor ó menor abundancia, igualmente que de su total supresion, resultan varias enfermedades que son mas ó menos difíciles de curar, segun es mas ó menos rebelde la causa que las ha producido.

Tienen esta evacuacion por el Utero, pero no obstante de ser este su camino regular, hay una multitud de exemplares de mugeres que han menstruado por la boca, por las narices, y aun por las papilas de los pechos, pero como adelante veremos de estas menstruaciones son mas bien enfermedades, que sitios ó lugares por donde deua hacerse naturalmente.

Hay grandes dudas sobre si esta evacuacion proviene del fondo de Utero, ó de la Vagina.

Los mas celebres Anatomicos lo creen del fondo del Utero, fundados en diferentes observaciones de Mugeres muertas en el tiempo de la menstruacion, en las que han observado turgidas las venas del Utero, algunas gromas de sangre y vias que comprimiendo algun tanto, salia por las vequillas de los vasos sangre.

Pero la unica prueba y mas convincente de que dicha evacuacion, es del fondo del Utero, es la experiencia que constantemente nos ha manifestado, que siempre que sale sangre, ó hay algunas evacuaciones en los primeros meses del preñado, se sigue el aborto, lo que no sucederia jamas, si esta sangre saliera de la Vagina.

No obstante hay y ha habido algunas en las que se han visto dicha evacuacion.

la  
menstrual, en tiempo de la preñez, sin ha-  
verse seguido el aborto; pero lo común y  
casi natural, es carecer de dicha evacuac.<sup>n</sup>  
en el tiempo del preñado.

Esta sangre parece que es venosa, y  
no arterial, por que ademas de ser oscura,  
espesa y rapida, sale gota à gota; lo que no  
sucede con la arterial, que es vermaja, anti-  
lante y sale con impetu; sin embargo es una  
sangre muy buena è inocente que no tiene  
alguna mala qualidad, sale immediatam.<sup>te</sup>  
de las venas; por lo que se deven desentrel  
las preocupaciones que reynan en todo el  
mundo vulgar de no desjarlas entrea en  
cientos paraps, ni que toquen algunas co-  
sas, en este tiempo.

La cantidad de sangre varia segun  
el metodo de vida, temperamento y cali-

dad de sus humores.

Las que viven deviles, mal criadas,  
sin exercarse en cara alguna, dadas à la  
Venus; menstruan mas, que las aldeanas  
robustas y fuertes, que siempre estan en  
un continuo trabajo y movimiento mus-  
culan.

Las que habitan en países calidos,  
menstruan mucho mas sin comparac.<sup>n</sup>  
que las que habitan en la Laponia; pero  
sin embargo la cantidad regular, es de  
ocho, doce ò catorce onzas de sangre.

Esta evacuacion suele venir à los do-  
ce ò catorce años, en cuyo tiempo estan ap-  
tas para la generacion, mas mas tarde,  
que otras; tan poco es fijo su termino; de  
cuarenta à cuarenta y cinco años suele  
terminar; varian segun las causas antie-



6  
dentas, pero casos raros no varian una ley general.

Esta evacuacion tienen tres periodos, principio, estado y declinacion; lo que deve saber un Medico, por lo que luego se dira.

En el primero, hay dolor en las Yngles, y aun dolor y arden en los Piñones, parada de cabeza, las orinas claras y abundantes, y tumefaccion en las pndendas; algunas padecen Lumbagos muy fuertes y violentos.

Sean en el segundo periodo estos sintomas, y sigue la evacuacion con abundancia, yendo poco à poco disminuyendose, y termina finalmente en una sangre aguada y descolorida.

Esta evacuacion tiene sus causas dispositivas y procatarticas, que la producen; una de ellas, es la pletoxa periodica que en

7  
fuerza de su mayor sanguificacion tienen; cuya pletoxa solamente es parcial, esto es, solamente del Utero, por que si fuera universal, las fuerzas de la vida, se habrian de avatia periodicamente, el cansancio universal, la flovedad, y en una palabra, habrian de aparecer todas las señales de una pletoxa general, viendo solo lo que manifiesta una pletoxa Uterina; devemos inferir que dicha pletoxa es parcial.

Ademas la Dorta inferior en las mugeres es mayor, que en el hombre, las celiacas internas estan casi perpendicularas al Utero, la cavidad de la pelvis es mas ancha y perpendicular; hay un sinnúmero de vasos que van à parar al Utero; el sistema venoso de este es mucho mas floxo, carece enteramente de valbular, y da

3  
su tejido mucho mas de si; luego no será extraño que en el principio de una plethora se dirija la sangre à esta parte mas bien que à otras.

Parce està determinada la menstruacion, para que el Utero se perfeccione, se lubrique y no se adhieran sus paredes para la concepcion.

Es una observacion constante que quanto mayor copia de sangre, hà à una entraña, tanto mas se aumenta la secrecion: Luego no será extraño, que habiendo en el Utero tanta necesidad de moco, que se concibe sin unirse, y lubrique esta parte, haya mayor flujo de sangre hacia ella que à las demas.

Està concebida la inevitabilidad de ella y aumenta la secrecion del moco, y aun

9  
de leche, que se hace antes de parir, dentro de su cavidad.

Siempre que esta evacuacion falta ó se aumenta, produce enfermedades, pero no siempre se deve atribuir à la supresion de ella, sino que muchas veces se suprime por anteriores enfermedades.

Sin embargo de que el tiempo apto para la menstruacion, es de doce à catorce años, suele la primera evacuacion venir con mayor dificultad à unas que à otras; las de temperamento tonico, no suelen tener novedad ó al menos muy poco; lo que no se observa en las grandes poblaciones, ó por la debilidad y vicios contraidos por la mala educacion, ó malos alimentos &c.

Algunas se preparan dos ó tres años, padeciendo ophthalmias, tumores, scrofulas y

otras enfermedades, que muchas se curan a la primera evacuacion, quando han sido periodicas y no continuas.

Hay grandes mudanzas en este tiempo, suelen ponerse enfermas ó por que está debilitada en constitucion, en cuyo caso no se puede hacer la pletora y se manifiesta la Clorosis, lo que se deve tener presente para no emprender la curacion al contrario, ó por que dejan de nutrirse, apatenciadas cosas extraordinarias; de donde se infiere que la supresion del menstuo puede provenir, ó de una falta de pletora ocasionada por la debilidad, ó de una resistencia en el Utero que impida su salida.

En el primera caso hagase que sanguifique, y menstruaia, quite la debilidad, deele tono a la fibra, impidase las ob-

trunciones y haran sangre; prescribanse las sangrias, emenagogos &c. que por presion han de aumentar la devilidad, y ocasionarle la mucate con mas prontitud.

Quando la supresion ó falta de menstruacion, viene por una resistencia del Utero, puede dimanar esta del demaciado tono y fuerzas de sus vasos; pero asi como varia la naturaleza en las fisonomias, del mismo modo varian en la constitucion interior de sus visceras, y hay algunas que deviendo tener flexos estos vasos; a tal constitucion, que tienen una resistencia enorme; viene la pletora parcial, no puede verificarse la evacuacion, la provienen soporas, hemotipris por anastomosis, y otras enfermedades que suelen con el tiempo, hacerse por diabrosis, y producen muy malos efe-

Algunas veces es la resistencia que presenta el Utero, ocasionada por una causa accidental, como el susto, la ira, meter los pies en agua fria, ponerse al frio actual, aplicarse paños de agua fria al vientro &c. se suprime entonces la evacuacion que ya habia venido.

Su curacion se verifica, ó determinando inmediatamente la plethora al Utero, ó extrayendo la cantidad de sangre que se debia evacuar, pues quitando la resistencia en los vasos, vuelve á aumentar el tono vital; en cuyo caso la sangria es un buen corroborante.

La cantidad se deve considerar, ó determinar, atendiendo al temperamento,

al periodo de la menstruacion, pues si es el primero devra ser mayor que el segundo, ó tercero, y las circunstancias de la enferma.

El sitio de donde se deve sangrar, es qualquiera, pero la preocupacion pide que sea del pie; y asi no hay inconveniente en que se haga; se evitara la luz, se tendra á dieta, se les daran algunas bebidas aguasas con algunas sales neutras, ó plantas aperitivas.

Si se presenten sintomas nerviosos, la tintura de Succino, ó qualquiera bebida calmante antisterica, frías á las piernas, humos de plumas ó de papel de estraza á las naricas; pero lo mejor el opio y sus preparaciones.

Hay otro caso en que no se menstrua por vicios particulares de la vagina; lo

116  
que sucede, ó por coalicion de las paredes, ó por la imperforacion del Himen.

Su curacion consiste en dilatar toda la Vagina, é impedir su reunion, y en perforar el Himen; lo que se hace con una canula poniendo en medio unas hilas para q. no se vuelva à unir.

Debemos tener presente que à veces da de sí tanto la membrana que avocada la sangre y no pudiendo salir; forma un tumor que sale fuera de la vagina, y hace crecer à los facultativos menos expertos, que es una prociencia del Vtero; lo que se prueba por las siguientes.

### Observaciones.

En el principio de la practica de mi Maestro  
D.<sup>n</sup> José Severo Lopez, tubo que subir un

117  
dia à ver al practicante de guardia en el Hospital de las mugeres; en cuyo tiempo se presentó una Toben diciendole que se le habia salido las tripas por sus partes sexuales, la registaron y vieron fuera de la vagina, un tumor bastante grande y que nada le dolia, aunque lo comprimian, le parecieron que seria una prociencia del Vtero y que estaria gangrenado. El practicante despues de estar en cama, le puso unos apósitos; al dia siguiente, fue el Cirujano mayor à la cura, y habiendo visto dicho tumor, hizo una incision, y le salieron unas ocho onzas de sangre con lo que quedó buena.

De esta especie de observacion se pudieran designar muchas, pero se omiten por la brevedad.

## Clorosis.

Se llama así, quando por una debilidad general se suprime la evacuacion periodica.

Hay muchas señales correspondientes para conocer el estado en que se haya.

Estas señales son el color palido y algunas veces histérico; pero con la diferencia que la adnata no se presenta pagiza como en la Yeterica, hay gran pesadez, mucho sueño, los ojos hinchados por la mañana, el color de lengua y boca algo palido, se fatigan mucho, son à veces acometidas de insultos que parecen asmaticos, tienen apetitos extraordinarios, padecen la pica, el olor de la boca es algo agrio, náuseas perpetuas, vomitas, el vientre se hincha, su sonido es como de tambor, padecen obstrucciones en el higado y muerte

ric, las orinas son blancas, espesas y cortas, un sedimento fufuraccio, viene el edema à las piernas, se propaga à los labios de la vulva, se produce poco à poco el Ascitis, y ultimamente la Anasarca, hay mucha sed, y à veces se origina una calenturilla lenta anfrinaxina, que suele producir una degeneracion lenta en los humores, y viene à parar en una tisis absolutamente incurable.

Otras permanecen mucho tiempo Cloroticas, sin advertirse todos estos sintomas.

La Clorosis se divide en humoral, espasmodica y mixta: Una y otras reconocen causas distintas.

La Humoral tiene por causa la mala cantidad y calidad de los alimentos, la inaccion, la falta de exorcicio, de respirar

el ayre libre, la vida sedentaria &c. en estos casos, no hay energia ni aptitud en el solido para sangrificar; bime la devilidad del estomago, mala digestion, la pica, y de esta las obstrucciones en el Meenterio.

La Nerviosa reconoce por causas, las pasiones de animo que obrando lentamente van devilitando la fibra animal y aumentando la sensibilidad de los nervios; el amor y los celos y el dardo de Venen, son las mas frequentes; aumentandose los spasmos, no se sangrifican, bime la devilidad, y de aqui la Clorosis.

Las que vian con exceso de la Venus, aumentan sumamente la devilidad, ó inactividad, teniendo dolores al ligamento umbilical, y finalmente los efectos de la Clorosis.

nerviosa; estos son la falta de sed, los afectos histericos à veces con una strangulacion que les impide tragar cosas liquidas, fatigas como astmaticas, gastrodinias, ó rinas claras y abundantes, viene la flegmacia de los pies &c.

Todos estos sintomas son transitorios, excepto la devilidad, el cansancio y el color.

La Anormal, se acompaña a veces de los sintomas nerviosos, y al contrario y entonces toma el nombre de Mixta.

El Pronostico es muy peligroso, sino hay remedios constantes y activos.

Su curacion se consigue con el regimen, que en todos, deve ser tonico y corroborante en toda su estension; el plan vital sera vando de las carnes, pues casi siempre es acida la degeneracion del esto-

mago en las Cloróticas, estan sean aromati-  
cas, juvenes, blandas, mezcladas con algunas  
versas; se variará de alimentar para limo-  
gear el apetito, pues es preciso que un solo  
alimento le fastidie, y así la variedad les á  
aprovechará.

No hay inconveniente de estimular  
el estomago para aumentar su accion, su  
sensibilidad y la abundancia de su jugo gas-  
trico; las sarsas de mostaza, canela, pimien-  
ta, en cortisimas dosis son muy utiles.

Se hará uso de la miel para acabar  
de comer, y las bebidas sean de aguas  
corroborantes, ovitando todas las cocidas  
por ser ingratas, corrompese con facili-  
dad y perder su virtud.

La rutina usa de cocimientos ape-  
titivos, así llamados, pero la mejor bebi-

da es el agua natural vinada, ó con la  
sal de Marte; se podrá usar del vino en  
moderadas cantidades.

Por lo que toca al coexercicio, será á-  
menudo; y si puede sea en ruedas ó à ca-  
ballo, pero no como el hombre, sino senta-  
da; por que de qualquiera otra postura,  
sin estan acostumbradas à los estímulos  
venereos, se les aumenta la sensibilidad,  
les vienen poluciones involuntarias y áme-  
nudo, y nada aprovecharian; pueden tam-  
bien los de pelota, bolante, y otros, suplir.

Pueden tambien usarse de las fric-  
gas repetidas, pues aunque no es su efec-  
to muy perceptible, se aumenta la accion  
del sistema muscular.

En la humoral se daran en el vien-  
tre y columna vertebral con balletas so-



las ò salinadas con el succino, cantueso, esplego, y otras.

Por lo que toca à medicamentos, hemus de saber que estos obran siempre con respecto à la disposicion del cuerpo, y à las diferentes especies de Clorosis; por consiguiente en un caso combendrán unos que queras no combendran en otros.

En la Clorosis humoral, donde la devilidad es esencial dimanada de las causas dichas, se empieza à obrar directa e indirectamente.

Suele principiarse indirectamente apartando los estorvos que pueden impedir que obran los medicamentos directos, por lo que si hay cacochilia, combendran los evacuantes, pero jamas fuera del ante-

nion caso; pero la sangria muy pocas, ò ninguna vez combiene; por que no haciendose ni buena digestion, ni buena sangnificacion, nos pondriamos de parte de la enfermedad y acarrearíamos mucho daño y ningun alivio.

Estos evacuantes sean ò purgantes, ò emeticos, procurando huix de los laxantes, como los acytes, manà y otros; por que laxando las fibras, aumenta la devilidad y no pueden producir buenos efectos; se procurará que sean purgantes tónicos, como el ruibarbo y sus preparaciones, el cremor de tartaro repetidos algunas veces al dia, el diagnidios y otros.

Como la devilidad del estomago e intestinos es considerable, como por su

inercia, jamas pueden quedar limpios, y como la accion de los purgantes no se extienden à las demas entrañas de la cavidad natural, que suelen por lo comun estar obstacidas, parece evidente que son preferibles los emeticos, pues ademas de evacuar la cacochilia, aumenta la accion secretoria y excretoria de todas las entrañas, y aun de todo el cuerpo, y dan un estímulo aunque pasajero de pies à cabeza; es preferible el tartaro emetico, pues la hipocamama fume mucho; despues de repetida la primera accion, se deve repetir de quando en quando, por que estando devil el estomago, aunque hoy quede limpio, vuelve à llenarse à los seis ò ocho dias.

Se han dado hasta aqui, muchas

aguas cocidas, como la de grama, tarax, citrulla mar., y otras, solas. ò con el Jarabe de las cinco raices ò otro, pero es incontrostante que quanto mas humedad haya en el cuerpo, mas se laxa, mas se devilita el solido y aconsequencia se acumula mayor porcion de sensividad; se deven pues proscribir absolutamente.

La curacion directa consiste en varios medicamentos; de estos unos son los llaman emenagogos; estos son los que suponen efectuar la evacuacion, como la sabelina, artemisa, y otras; pero son enteramente inutilis por que no habiendo sangrificación, no puede hacerse esta y jamas podría verificarse la evacuacion.

Otros son los tónicos estomacales los que facilitan la digestion, aumenta las fuer-

zas, y reaniman la maguina; la quina y hierro, la tintura de quina con el coquillo de la menta piperita, son excelentes.

A los que por delicadeza ó mala educacion no asisten tomar la tintura de quina se les dará las pildoras del extracto de quina con el ruibarbo y el azafrañ de marie y sal de agnosos.

Estos medicamentos se han de dar en cortas cantidades, pues si se dan en mucha estimulan demasiado, ó inducen al fin de vida; dandolo en cortas dosis se incrimaran facilmente, sin que su accion pueda estimular solo blandamente, pero se daran á menudo para que este blando estímulo jamas falte del estomago.

Se advierte que ni el Medico, ni las enfermas deben administrarse de vez el ex-

cremento semejante á la Atrabilis; por que esto es solo efecto del hierro, y siempre que se toma se manifiestan los excrementos de este color.

No obstante á veces estos medicam.<sup>tos</sup> por que hay algunas obstrucciones en el higado y mesenterio, no aprovechan, y entonces es necesario desornar, para cuyo caso son muy buenos los Jabones, y así se pueden usar de las pildoras de Jabon con el azafrañ de marie y la hipocacuanas; tambien son buenas las pildoras tartaricas.

Exteriormente se usará del Jabon. cillo ammoniacal, u otro: Si las obstrucciones fueren grandes, se usará de la Cienca sola ó con el mercurio dulce en cortas dosis, pero sin dexar la quina y demas pildoras tónicas, alternando unas veces con las fo-

nicas, y otras con las fúndentes; aprovechan muy mucho las aguas ferruginosas, y así que las beban, ya naturales, ya artificiales.

Este plan en general deve propinarse, pero no obstante en las formas-copcas, hay muchas composiciones pero siempre son casi todas preparaciones diferentes del zinc y el antimonio.

Hay además algunos medicamentos vulgares muy celebras: Se usan el Madrid del agua de capaxosa que con ella se han curado muchas, y tambien con las pil-doras que llaman de Spiritu Santo, que son las Benedictas de Fuller.

Quando por este metodo, se empieza à hacer una buena digestion, se aumenta el apetito, se ban poniendo rubicundas las mejillas, empiezan à sangrificar, y bienen finalmente las señales de plenitud.

Se determinará la pletona hacia el Vtero, usando de los remedios ya dichos sin dejar el plan tonico; pero quando no sultan el efecto que se quiere, se podrá usar de la electricidad, por q. accelera notablemente la velocidad de los líquidos, unico caso en que puede combenir, pues qualquiera evacuacion que por este medio se promoviese en otras circunstancias, seria una verdadera Menorragia que acarrearía muchas inconveniencias.

No tienen directamente lugar los medicamentos dichos en las Clorosis Spasmodicas, pues dependiendo en esta la devilidad de un spasma chiradero y constante; los remedios antispasmodicos seran los medicam. directos; si por efecto de los spasmos hay vias en primeras vias, se procuraran tener limpias, y en seguida se daran los Antispasmodicos.

La Clorosis amatoria, es incurable si no podex remouerse los estorbos que lo impiden, y así el unico remedio seria calmar la vehemencia de la passion por medio de la posesion del objeto amado; pero dentro de los Claustros, donde es inasequible este medio, no hay mas adritio que quitar los spasmos, para esto se procurará distraer su imaginacion; lo que se hará no dexandolas solas jamas, teniendolas en un exercicio constante, evitando la hambre por que es asfodiaca, haciendoles comer por fuerza, dandoles vino à beber y en crecidas cantidades, pero que no deviliten; se tendrán siempre en conversacion, evitandoles el ayuno y viglias, como tambien la oracion mental, pues incessantemente se aumentan los estímulos de la carne; los peccados y las in-

les aumentan la sensibilidad del sistema nervioso, y así deven prohibirlos.

Se usará si, del Opio en grandes cantidades, el Admiselo y Arafetida con los verdaderos medicamentos, aunque no suelen quedar perfectamente curadas, por que así que cesa la accion de ellos suele boluex la enfermedad.

El Alcanfor se dará à la dosis de veinte, treinta, ó cuarenta granos.

El Admiselo à la de un scrupulo ó uno y medio, y lo mismo del Arafetida; siempre se han de dar por la boca y rara vez por labativas, como no haya grande necesidad, y en este caso se harán con una poca de leche, una yema de huevo y una buena dissolution de Opio y Arafetida.

Habiendo hasta aqui hablado de las

Clorosis de las Virgenes, expuesto sus principales causas, sintomas y curacion; restandos hablan de otras especies de Clorosis que se observan en la practica.

## Clorosis de las Preñadas.

En este tiempo se observan las tres especies, à saber Spasmodica, Humoral y Mixta; aunque los autores no hacen mención sino de la humoral.

Si observamos en el principio del embarazo de una muger sana, robusta, e irritable, sin vicio alguno humoral, vemos que en el primero, segundo y tercero mes, hay todos ó la mayor parte de los sintomas de la spasmodica, à saber laxitud espontanea, aduersion à las cosas acostumbradas, nauseas continuas, apetito deprimido,

strangulacion de garganta, y demas sintomas histericos, los que siendo pasajeros e intermitentes, parece que son puramente nerviosos, que nacen de un estado de irritacion que obrando en el Plexo Uterino, se propaga à los demas Plexus del cuerpo produciendo de este modo la debilidad, fatigas y ansias que manifiestan las Clorosis Spasmodicas.

No es así en lo sucesivo del quanto mas en adelante, crecen lentamente las manchas, se pone la cara colorada, las venas de la cabeza turgidas, las manos rubicundadas, arrojan sangre por las narices; sintomas todos que denotan una Anastomosis vascular dimanada de la compresion que el Utero ejerce sobre todos los vasos de la aorta ventral.

En los ultimos meses dilatado el

34.  
Vicio mas y mas, llega à tocar al fondo del estomago, comprime algun tanto el Higado y demas partes de la cavidad natural, se detiene el vientre y orina, se abultan las venas hemorroidales, de modo que muchas padecen Almorranas, hay despanos, mal olor en el aliento dimanado de una Cacochilia Biliar, que constantemente hay en el estomago y duodeno; por la misma compacion se detiene la linfa en las extremidades de los vasos, bienen las edemas à las extremidades inferiores, tienen una pletora parcial del Diafragma arriba, hay finalmente una verdadera Chloris Humoral.

Este humor es acre, estimulante e irrita el sistema nervioso, sobreviene la Chloris Humoral, spasmodica y mixta.

Para su curacion debemos distinguir

35.  
guia igualmente los tres estados.

En el primero donde los sintomas son puramente nerviosos, se varrà de uno à otro antispasmodicos y nunca la sangria, costumbre adoptada en el diccionario de los Medicos vulgares; si en algun caso combienen los antispasmodicos nutritivos, u en este, no tanto por lo que mitan, quanto por lo poco que la naturaleza tiene que trabajar para asimilarles; las lechas, las Juleas, las manos de carnero, y demas sustancias mucilaginosas, son buenas; haciendo tambien un moderado ejercicio; es muy comun la degeneracion acida de los humores, las que muchas veces velica el sistema nervioso, y aumenta los sintomas del spasma; en cuyo tiempo se varrà los absorbentes pero en conta canti-

dad para que no se bucban purgantes, repetidos tres ò quatro veces al dia; la mayor necesidad es muy buena tomando quanto quepa en un polvo.

Si fueren grandes los sintomas nerviosos, se usará de los antispasmodicos calmantes, pero cuidado con el opio por que si algun medicamento se encuentra que sea abortivo, es seguramente este, lo que de muestra al parecer las siguientes.

### Observaciones.

Habiendo sido mi Maestro llamado para visitar una Señora embarazada de tres meses que padecia una toz rebelde y violenta y examinandola exactamente, no advirtió vicio alguno por el que pudiese ser producida, y así considerandola pu-

ramente spasmodica; le mandó seis granos de pildoras de Sinoglora, repetidas cada doce horas; calmó con este remedio el spasma, cesó la toz pero la enferma abortó sin dolor alguno.

No le causó esta novedad la mayor impresion; fue llamado para otra que estaba en el mes quanto de su preñez, y habiendole dado la Sinoglora, le sucedió lo mismo.

Este segundo exemplar llamó mucho su atencion, y principio á reflexionar si acaso el opio seria el que habia producido el aborto; asustada su imaginacion con este pensamiento, y hablando ambos casos con un discipulo que llevaba con sigilo, procuraba disuadirle por todos medios que el opio hubiese producido semejantes efe-



tos; pero mi Maestro calculó y formó el discurso siguiente.

El Opio obra en el sistema nervioso, aunque se ignora el modo. El Opio mata las lombrices, mata à los animales, y dado en gran cantidad produce al hombre una Apoplexia Narcotica; lo mata en una palabra. El Opio quando está aumentada la sensibilidad de vida excedente, la apaga. Luego teniendo el Fetus muy poca vida en los primeros meses, podrá muy bien quitarla al Fetus, quando es capaz de quitarla quando está aumentada mucho mas que la puede tener el Fetus en aquel tiempo.

Aucho este discurso, quedó bastante persuadido que era capaz de producir el aborto, y así procuró abstenerse de administrarlo en los primeros meses; y se acor-

bó de confirmarse mas quando habiendolo llamado à visitar à la Señora del primer caso que se hallaba tambien embarazada, y no pudiendo ir, embió à un Medico amigo suyo, quien habiendo observado que dicha tos era puramente spasmodica, la dió el Opio, è inmediatamente le siguió el aborto.

Estas observaciones nos dan à entender que debemos ir con mucho cuidado en la administracion del Opio en los primeros meses, y en su lugar se pueden dar unturas calmantes exteriormente è interior el Alcanfor, Azafetida, y aun el Eter Vitriolico.

Del quinto mes en adelante no hay inconveniente en dar el Opio en cantidad,

por que el Fetus es entonces un viviente, casi como nosotros.

Veamos advertir que aunque la sangría del pie se ha tenido como remedio à borbido, la experiencia ha demostrado que jamas ha abortado las que han usado de este remedio, à no haber tenido una extrema debilidad, y muchas veces es la sangría del pie un tónico y un medicamento que impide el aborto como se ve en la siguiente.

### Observacion.

Una Señora habia tenido diez abortos seguidos, sin que para evitarlo hubiese bastado quantos remedios se habian intentado, ya administrados por Profesores, ya de los que llaman caceras: Se hizo embra

zada, fue llamado mi Maestro la examinò, la encontró bien constituida sin vicio alguno, inspeccionò el Utero, y le pareció que el orificio estaba bastante floxo, y no hallando causa alguna à que atribuir tantos abortos, reflexionò de este modo.

Aquí hay una gran turgencia en los vasos del fondo del Utero; esta impide que la sangre se distribuya con igualdad, y por consiguiente hay mayor tono en el fondo, mientras que su orificio está en un estado de Atonia; crece el fétus, sin pero no es sostenido por no tener fuerzas el orificio para contraerse, se desprende y cae naturalmente produciendo el aborto; luego si yo disminuyo la demasiada turgencia del fondo del Utero y se distribuya con igualdad por todos sus va-

se la sangre, adquirirá un tono igual, y podrá contraerse el Orificio.

Como estaba persuadida que de qualquiera modo abortaria, no puso repugnancia en dejarse sangrar del pie, que fué lo primero que mandó mi Maestro.

Hecha una buena sangria, procuró llamar la sangre à las Visceras internas por medio de fricciones continuas; pasados quinze dias le repitió la sangria del pie sin dejar de darlas friegas; reconoció despues el Vtero y bió el orificio que estaba fuerte y robusto y juntamente contraido; al ultimo mes le hizo otra sangria, y tubo la satisfaccion de verla parir con felicidad.

Despues de haber pasado tiempo se hizo embarazada, y quando unas veces este metodo y otras no, ha parido siempre

bien.

Asi como la sangria no es un hemonagogo; tan poco el emetico, antes al contrario parece que con su acción cicera mas bien la boca del Vtero y contrae sus vasos, como se advierte en las Menorragias, y aun parece que la naturaleza evita el vomito en los primeros meses para que se cicere, perfectamente, pues si fuera emenagogo era preciso que siendo en todas constante los vomitos, ya con materia ya sin ella, todas abortarian; lo que jamas se verifica: Devermos pues detenernos semejantes preocupaciones.

Volviendo à nuestro objeto, digo que en los demas meses, se dejan puramente à la naturaleza, procurando que el vientre esté siempre lubrico por el uso de algunas

sales neutras, y labativas; es preferible el  
Exorno de tartaro, y las demas sales.

En los ultimos meses si hay mucha  
debilidad, hay coleccion de humores serosos  
ò biliosos; entonces se deve hacer uso del plan  
tonico y corroborante ademas de los reme-  
dios dichos; pues quanto mayor es la debi-  
lidad, menores las fuerzas, y si bixiere una  
puerperal con los signos de putrida se invu-  
tilizarian todos los remedios antispasmo-  
dicos, y no obrarian por la gran coleccion  
de humores; lo que no sucederia quando  
anteriormente del plan tonico dicho.

### Menorrhagia.

Esta enfermedad es comun à todas las muje-  
res en qualquiera estado en que se encuentran,  
ya sean Virgenes, ya Embarazadas ò Cavadas.  
Reviendo las mugeres tenen evacuacion

todos los meses una vez, si llega el caso de  
verificarse tres ò quatro, ò aunque sea una ve-  
la siendo excesiva la abundancia de sangre, y  
mucho mayor que la que deven arrojar, en vir-  
tud de su pletora parcial, y se observan los sin-  
tomos de palidez, vertigo, debilidad a las pier-  
nas, desmayos &c. esta enfermedad se llama  
Menorrhagia; pero si esta evacuacion se conti-  
nua y al mismo tiempo pagueña, saliendo  
la sangre de lo que llaman fluxus blanco, go-  
ta à gota, y sin intermision se llama enton-  
ces Stilizidio ò Vteri ploratus.

La observacion ha manifestado que  
en casi todas las mugeres viene la evacua-  
cion del fondo del Vtero; no obstante hay exem-  
plares que han manifestado haber proveni-  
do de la Vagina.

Esta evacuacion reconoce muchas y  
diferentes causas, de la que proviene en el fi-

empo de la Preñez, en el parto y puerperio, hablamos tratando de estas enfermedades, y examinaremos las que indiferentemente, puede producirla en qualquiera tiempo.

La primera de las causas que puede producirla, es la textura debil y floxa del Utero, pues cediendo demasiado al empuje de la sangre en el tiempo de la menstruacion, finalizada no tienen los vasos la fuerza necesaria para contraherse; no habiendo resistencia, deve por leyes mecanicas avocarse la sangre à esta parte y producir la Menorragia.

Las pasiones de animo, con otras que puede producirla; en efecto hay algunas que aumentando extraordinariamente la reaccion de corazon, aumenta la accion del sistema vascular y todas las excreciones y secreciones.

La alegria es la mas comun, la ira, y

à veces se ha observado que el susto mismo ha producido la Menorragia, deviendo hacer lo contrario, por razon de todo el sistema digo el Spasmo universal de todo el sistema vascular en fuerza de las mutaciones del nervioso; pero la debilidad inducida à consecuencia del spasma, puede muy bien producirla.

El abuso de los placeres de Venus produciendo muchos estímulos, y de consiguiente mucha floxedad, es otra de las causas.

Los baños calientes, ya universales, ya semicuipios, relajan mucho el sistema vascular ó capilar, y producen estas fluxos.

Las tocas violentas, el levantar pesos extraordinarios y extravagantes, el abuso de los emenagogos, el celibato, las excoriaciones, úlceras, y tumores scirrosos de Utero degenerados en Cancros, son otras tantas causas que pueden ocasionarla; las que deven tenerse presentes,

por que siempre variará la curacion, segun vario las causas que la produce.

La han dividido en Menorragia por Anastomosis, Diapedesis, Diuresis y Diabrosis.

Esta division combiene à todo genero de flujo de sangre; no declará por esto de tenerse presente en esta enfermedad, pues siempre será peor el pronostico, como V. G. si es por una Diabrosis que por un Anastomosis.

Tambien la han dividido en activa y pasiva.

Activa, quando es producida por el exceso de energia y actividad de los solidos.

Pasiva, quando es por debilidad ò otras causas.

El pronostico será mas ó menos peliposo segun las causas.

La que viene de ulceras solidas dige-

solidas, ó vicios cancerosos en el Vtero es incurable.

La que es producida por pasiones de animo, puede curarse con facilidad.

Son muy dificiles los Stilicidios ò Vteri Pioratus.

Las menorragias sintomaticas que vienen de fiebras putridas, son incurables, y que denotan una gran disolucion en los humores.

Ya hemos tratado de las señales de la Menorragia, causas y pronostico, y nos resta hablar de su curacion.

Esta deberá ser varia segun las diversas causas que la produce; por consiguiente si esta es activa, es pletorica, y la produce en una Toben robusta, en la que han concurrido todas las señales de una pletona, par-

30  
cial; deberá warse de una dicta regular, se lo  
sangrará, se pondrá en una situación que no  
favorezca al flujo, se pondran en piecas frias  
y al fuego, se wará del agua de nieve; algunos  
wan los acidos, no hay duda que son muy uti-  
les, pero hay algunas que son tan irritables  
que wando de ellas les viene la Mistralgia,  
por lo que devemos entonces abstenemos y so-  
lo waa del agua fría; coterionmente haremos  
uso de los paños de vinagre agnado, de la nie-  
ve, y se han visto ser tambien utiles las com-  
presiones.

Otros han determinado toda clase de  
remedios para qualquier Menorragia, y sin  
ha aprovechado vno ni otro, buchan mano de  
otro, y así de los demás; por lo que han wado  
de los Abstringentes, los que solo waremos  
quando sea producida por la devilidad,

51  
del solido y ternidad del fluido.

Tambien han wado de los apercencibos  
à los pechos, como las ventosas y otras, pero  
no estamos convencidos de su utilidad, ò es  
casi imposible quitar la plétora que está de-  
terminada al Utero; lo segundo por que hay  
una gran combucion en los cuerpos glandu-  
losos de las Mamas; y lo tercero por que da  
lugar à Sianas y otras enfermedades.

Otros han wado de las inyecciones  
al Utero del cocimiento de quina con el acido  
sulfurico; del sumo de Ontigas, cocimiento de  
las cascarras de granada; y Mistor de las in-  
yecciones del Alcohol; pero nos parecen insufi-  
cientes por no haber contacto fisico con la  
parte afecta, respecto à que la situación del  
orificio, solo cre perpendicularmente à la va-  
gina en el tiempo del primado estando obli-

guamente en los demas, impidiendose por consiguiente la entrada de los liquidos inyectados.

La Menorragia Spasmodica, no reconoce por causa la pletoxa.

Suele acometer à las de un temperam<sup>to</sup> bilioso; sobreviene por pasiones de animo, y es pasiva.

Las sangrias son enteramente inutilis y aun nocivas, pues aumentando los spasmos, aumentan la devilidad ó al contrario.

Tan poco son vitales los medicamentos frios, ni los acidos, ni los abstringentes, y solo los calmantes pueden tener lugar; el opio y sus preparaciones, el etor sulfurico y el licor amido mineral de Stotman.

Sin embargo como muchas veces se complican los sintomas histericos, podran ut-

tar combinarse con el asaftida, succino y castoreo.

En las Menorragias producidas por laxitud y devilidad del solido, se conoce por la constitucion de la enfama y estado de sus humores.

El plan tonico y abstringente tienen lugar, y asi han usado del cocimiento de Simarubia, de la Tormentila, Vistorta, el Taro de Sinfite, el Luno de las ortigas, la emulsion de Bellotas; pero son preferibles el Vitriolo y sus preparaciones, entre estas el Alumbre.

Despues se podria usar de los tonicos abstringentes, entre estos la quina y el licor no merecen el primer lugar.

Fluor Albus.



56.  
Entendidas las principales ideas que hay que saber sobre la Menorragia, vamos à tratar de otra evacuacion muy comun tambien al otro sexo, conocida con el nombre de flores blancas, Fluxo blanco ò Menorragia.

Esta es una evacuacion continua, ò intermitente de un humor seroso ò linfatico, y à veces sanguineo; la que puede ser simple ò complicada con la Bleenorragia Virulenta.

Es comun à todas las mugeres y en todas las edades, pero se observa mas frecuentemente en las que han tenido muchos partos laboriosos.

Varia en quanto à la cantidad, calidad y diversas condiciones de este humor; à veces es muy corta, y otras tan copiosa que parece un flujo grande; en cuyo caso se ponen los enfermos muy debi-

35  
les, palido el semblante, tenue el pulso, tienen astio à las carnes y otros sintomas que manifiestan los grados que semejante evacuacion produce.

En quanto à su qualidad y condiciones, unas veces es puramente seroso, no se percibe olor en él; otras espeso y glutinoso, dejando en las ropas unas costuras como clara de huevo; unas es blanco, otras palido, y otras transparentes; y tambien se advierte burdoso como en la Bleenorragia Virulenta.

Quando es muy acce suele ser sanguineo, y se muda, pocos dias antes de la menstruacion.

Ha habido muchas opinionas sobre el sitio de donde dimana este humor.

Unos creen que sale de los labios de la Vulva, fundados en muchas observa-

ciones de Niñas imperforadas, en las que se han visto semejantes fluxos.

Otros de la Vagina por estar ilacos los labios.

Otros finalmente del fondo del Utero.

Pero no hay duda en que de todas estas partes puede venir, y asi ningunas determinaremos particularmente.

Se creera del fondo del Utero, si al tiempo de menstruacion hay pesadez en el hipogastrio, y no se verifica ardor, ni dolor al coito en las cavadas; lo que si se advierte quando es de la Vagina, y por la vista se examinara si es de los labios de la Vulva.

Muchas son las causas que pueden producir dicha evacuacion; la primera es la mala coccion de los alimentos propios de las de un temperamento laxo que son

muy inevitables, pues produciendose una acrimonia acida en su estomago, engendran una sangre aguanosa y glutinosa con poco calor, la que se determina hacia el Utero por la mucha floxedad de su sistema vascular; por consiguiente todas las causas que puedan producir y engendrar esta mala sangre, seran otras tantas causas del fluxus Albus.

Otra de las causas es la debilidad y laxitud del Utero, ó irritabilidad de su sistema vascular, producida por el immoderado abuso de la Venus.

La debilidad del Utero dimanada por las distenciones repetidas en los muchos embarazos, ó los que han supido partes muy laboriosas, ó á quedado por algun tiempo la Placenta adherida al Utero, es tambien otra causa; aunque esta regla es muy general.

Tambien son otras, los abusos de ciertos medicamentos internos, aunque estas no son las mas comunes.

El pronostico en esta evacuacion no es muy peligroso, à no ser immoderada; por lo comun no quita la vida, pero es muy rebelde, pertinaz, & incurable las mas veces.

La de las Niñas muchas veces se cura.

La que sobreviene à las plantas laboriosas y abuso de la Venus, es incurable si no esta en las manos del Medico, ni evitar estas causas primeras, ni los estimulantes mentales.

La que se observa en las Monjas, es muy obstinada y rebelde, y lo mismo las demas.

Para conseguir la curacion se deve atender à la causa que la produce, al sitio de donde viene, y la calidad del material y la variedad de su color.

Si es por debilidad de digestion y general, si el humor es seroso sin sintomas de ardor ni escadecimiento; se hará de la dieta tónica y nutritiva, pues si solo waramos de esta habiendo mucha debilidad en el estomago se haria mala coccion; lo que no sucede si bà acompañada de los tónicos, pues estos estimulan blandamente el estomago y aumentan su accion.

Se hará exercicio activo y pasivo, como las frías, equitacion, bolante, y otros.

La medicina será corroborante, pero que estimule blandamente; parece firme la

preferencia la quina y el hiezo, pues obran con mas eficacia en las visceras Hematopoyeticas, y en el sistema capilar.

Siendo larga la enfermedad se deberan hacer diversas preparaciones de estos medicamentos subministrados ya en substancia, ya en tintura, pildoras &c. para no fastidiar a los enfermos con una misma, dada por tanto tiempo.

Hay algunas tan irritables que no pueden inmediatamente sufrir la accion del hiezo, y entonces se les dara antes la quina, y despues las pildoras tonicas compuestas de una dragma de quina, un escrúpulo de asafran de mante, veinte granos de mirabarbo y medio escrúpulo de la sal de iugos.

Tambien aprovechan las aguas mi-

nerales vitriolicas, por que succeden y corroboran, como igualmente las sales, por que incluyen tener una porcion del Inuriate Calcaro.

Se dara rigor e inmerciones en agua fria, pero no ha de haber obstrucciones en el Mesenterio, y demas visceras del Vientre.

Han usado muchas plantas, pero inutilis.

Por topicos se podran usar las inyecciones, pues aunque no penetran dentro del Utero, llegan al orificio y pueden entonar algun tanto; estas seran las aguas minerales y cocimiento de quina.

Esto se entendera si la calidad del humor es bueno, pues si es muy acro, acorria la vagina y vulva y hay flogosis; entonces las inyecciones seran dulcesicantes, como las de cocimiento de cebada, malvabico, zaranga-

tona, goma arábica, troscos blancos de ris, y otros.

Exteriormente se usará del unguento rosado, la manteca de saturno, la de bacas fresca y sin sal.

Pasado ó mitigado el ardor y la flogosis, bndran bien los cocimientos de quina y demás.

Las que son producidas por vicios locales en las robustas é irritables, cuyo vicio es efecto de la debilidad inducida en la vagina y Utero, por el mero abuso de los placeres de Venus, no necesitan de la medicina interior á no ser tan copiosas y exorbitantes que produzcan palidez, debilidad, congoja y desmayos; en cuyo caso sería preciso hacer uso de los corroborantes nutritivos, y los leches; y la cura principal consiste en

quitar las causas que las producen; siendo por consiguiente la debilidad é irritabilidad tópicas; está indicado calmar esta y dar tono á aquellos vasos.

Los tónicos locales pueden ser ó directamente tónicos y antispasmodicos, ó indirectamente tales.

Si el humor que fluye es acre y corrosivo, se deberá lubricar; si tiene mal olor y es algo putrido de los antispasmodicos veremos hacer uso; y si es puriforme lactinoso, sin mal olor, los directamente tónicos.

Se daran los giringatorios quatro ó seis veces al dia; pero si el humor fuere tan tenue, acre y corrosivo que estos no aprovechan, los mucilaginosos en grandes dosis.

Se evitará todo ejercicio activo y pa-

sivo, pues este aumenta extraordinariamente la secrecion, y à consecuencia la exortacion.

Para la cura directa se usaran los corroborantes dichos, prefiriendo los gexingotonicos de tintura de quina con el eter vitruellico à veinte ó treinta gotas, ó el licor amoldino mineral de Flotman.

Se ha de advertir que este flujo de veses, no muy antiguo, pues si lo es, es incurable.

Los fluxos que nacen de estímulos mentales venereos, producen spasmos, y excitando polusiones requieren el uso de los calmantes interiormente dentro de la Vagina, y así podran ponerse seis ò ocho granas de Opio en dos libras de agua.

Los que por plenitud y orgasmo en el Utero, requieren sangria, la dicta, la quie-

rud y las bebidas atenuantes.

Es necesario ademas corroborar el Utero con los tónicos, con el agua fria, y tambien se pueden envolver con paños de vinagre aguado la cavidad de la pelvis.

### Histeralgia.

Esta enfermedad es muy comun en las grandes poblaciones en todas las que son jóvenes, y estados.

Exige la mayor atención del Medico, pues muchas veces aparecen sintomas tan violentos, que à no estar bien instruidos nos ponen en conternacion y juzgamos que las enfermas van à perecer, quando quedan perfectamente buenas desapareciendo en un instante.

Es tambien muy rebelde y peñti-

naz, por que coinciden con mucha facilidad.

Consiste en una afecion preternatural del Utero, que se manifesta con frio en las manos, plantas de los pies, rubicundez de ojos, tension en los hipocondrios, una sensacion á la garganta como un globo q. le llaman histérico, los labios y lengua se ponen balbucientes, á veces lipotimias, letargos, contraccion de pulso, dificultad en la respiracion y otras sintomas extraños, que nos hacen creer ser diferentes enfermedades.

Toma la denominacion de la causa que la produce, y asi si procede de pletores, se llama *Histeralgia pletonica*; si por lombrices, *Vermínosa*; si por pasiones de animo, como susto, *ina d. ab animi patemata*; la principal es la *Afnodiriaca*, que es

producida por estímulos venereos mentales; tambien los excesos en comidas y bebidas acidas, la pueden ocasionar.

El pronostico seria vario; segun la causa, es mas ó menos rebelde, y es mas ó menos peligroso.

Por curaciones diversas se quita esta enfermedad; una Coacta, que es la que deve hacerse en tiempo del paroxismo ó insulto; y otra Profilactica, que es la que consiste en quitar las causas que pueden producirla.

Para la coacta combiene los medicamentos que moderan la sensibilidad e irritabilidad, y á consecuencia el estado de la Magnina: Son varios, pero los mas comunes, son los oloros fetidos, como los de plumas, del aceyte de succino y del azafetida;

los corroborantes aplicados al vientre, como la manteca de ruda, y las compresiones à la region Epigastica, aunque este ultimo remedio lo reputaban muchos, pero nos parece que es perjudicial en el estado de salud, pero en el estado del paroxismo pueden estas fuertes compresiones, disminuir la sensibilidad, y por consiguiente ser utiles.

Tambien han usado de las Ventosas al ombligo, ademas los anodinos narcoticos, y fetidos, como el emplastro de galbano, meliloto, azafetida; los aromaticos inyectados por la Vagina, los que ademas de no estar en uso, pueden ser perjudiciales à las Ovarias, ò por que no pueden pasar del Utero, ò si pasan serà rompiendo este.

Las lavativas sean buenas en todas las ocasiones; quando la enferma sea gloton

y hay materiales en primenas vias, ò quando se quiere quitar el paroxismo; en cuyo caso sean los medicamentos antistericos, como el azafetida disuelta en hiema de lievos, ò una dragma de alcanfo en un poquito de spiritu de vino, y el cocimiento de la manzanilla, el agua de ruda y otras; son preferibles las que se hacen con dos dragmas de triaca, diascondio, y filonio romano.

Quando no bastan se usará de las bebidas antispasmodicas ò antistericas, las que sean eficaces, y en poca cantidad; se componen de aguas, aunque estas tienen muy poca virtud, de melisa, brionia, ninfea, y así à quatro onzas de qualquiera se puede poner una onza de Jarabe de corteza de cidra, y uno ò dos scrupulos del licor



anodino, aunque el mejor es el eter sulfu-  
rico mezclado con un poco de azucar, y  
tragandolo inmediatamente en una cucha-  
rada de agua.

Tambien han usado de las confecio-  
nes, pero no son utiles las opiadas.

El laudano se dara toda la dosis,  
pues en poca estimula, y aumenta el paro-  
xismo.

Quando se dificulta la deglucion por  
el globo histérico, se verá si pueden tragar  
una ó dos pildoras de opio, Alcanfor ó An-  
fetida unidos, aunque el opio puro es mejor.

Si la enferma es delicada, los insul-  
tos son ligeros, y por causas pequeñas; en-  
tonces se les dara qualquiera cosa, pero si  
fueren fuertes, las opiadas.

Tambien han usado de las san-

grias, friegas, pedilubios y ligaduras, pero si-  
empre es perjudicial la sangria à no venir  
por supresion y haber pletoxa; los pedilu-  
bios à las que son de fibra rigida y no les  
ataca la cabeza, de nada sirven; las friegas y  
ligaduras seran utiles para llamar abaxo el  
cervelo siempre que esté atacado el cerebro.

Pasado el paroxismo, para la cura  
Profilactica, es necesario indagar la causa.

Si es de debilidad en general ó gene-  
ral, los corroborantes, como la quina el hier-  
ro, los riegos de agua fria, y los dichos.

Si procede de lombrices, destruilas;  
no hay algun remedio seguro; unos han u-  
sado los amargos, otros los purgantes, otros  
los mercuriales, otros muchas preparacio-  
nes diferentes, en las mas de estas entra  
el mercurio.

Es preferible la mirona ò acceyte de morro, los polvos Santonicos hasta un scrupulo, la azucar Vermifuga, y sobre todo despues de limpiar las primeras vias, la quina sola, ò con los acidos.

Si son Menidas las labativas; se dan por un remedio excelente los trasiscos, y sobre todo es excelente para despegar las Sanguijuelas.

Si proviene de la Vindex, no hay mas remedio que casarse, y quando no vea de agua fria y del opio, pero si ha durado mucho tiempo, ni aun el matrimonio lo cura.

### Esterilidad.

Ademas de las enfermedades referidas, hay otras dos comunes al sexo, que son la Esterilidad y Furor Venereo ò Melomania, de

las que hablaremos sucesivamente.

Por esterilidad se entiende la falta de disposicion para la concepcion, la que depende de muchas causas, unas sensibles y perceptibles à la vista, y otras que nos son desconocidas.

Una de ellas es la debilidad de los organos digestivos, aunque es muy general y no deja de tener algunas excepciones.

Los flujos copiosos de sangre son por lo comun. Los vicios particulares de las partes de la generacion, como son la imperforacion de la Vagina, la coalicion de ella y su consistencia callosa, la existencia extraordinaria del Clitoris, la imperforacion del Vtero, aunque hay observacion de haber concebido estando imperforado, lo que es muy raro, los tumo-

res scirrinosos &c. las obstrucciones de las  
 tubas, i hidropesias de los ovarios, el virus  
 raquitico, el serofuloso y venereo, aunque  
 en estos virus hay una grande anomalia,  
 pues unas quedan esteriles, quando  
 otras que antes eran infertadas de este  
 virus, se hacen muy fecundas, cuya ana-  
 malia se ignora en que consista.

Otras veces nace la esterilidad de  
 falta de tono en el Utero, trompas y ova-  
 rios.

Otras veces es respectiva, es decir  
 con uno conciben, y con otro son infecun-  
 das, y este mismo tiene hijos coavitando  
 con otra.

Por lo regular son incurables y se  
 tienta à bulto su curacion.

Hay unas que se sugetan al arte,

mientras que otras no pueden destruirse  
 sus causas de modo alguno.

Para las que se sugetan al arte hay  
 remedios positivamente tales que pueden  
 destruir la causa.

Otros hay muy activos, y otros que  
 son puramente empiricos.

La que viene por imperforacion se  
 cura con la operacion.

La que es producida por polipos,  
 por la atropacion.

La que de scirrros y canceros, con  
 la cuenta y el mercurio dulce, y las injec-  
 ciones à la Vagina, y todo el metodo del  
 cancro.

La venerea, por el uso de los mer-  
 curiales.

La raquitica, por el muriate,

calcaneo.

La clonotica, por los tonicos constantes que aqui aprovechan mucho, los que ya quedan repetidos.

Se les pueden permitir todos los medicamentos que conocamos no les perjudican, como el emplastro de Jabon, el confectivo de vigo; pero es preferible el de ciueta y galbano.

### Preñez.

Oviendo segun el metodo propuesto tratar de las enfermedades de las preñadas, nos ha parecido conveniente exponer que es embarazo y que señales no lo han dado à conocer.

Por embarazo se entiende una elevacion del abdomen que empieza de la par-

te inferior à la superior, dimanada de uno ò mas fetus con sus membranas que sucesivamente van tomando incremento dentro de la cavidad del Utero, hasta que conchuido el termino de su madurez, la naturaleza y el fetus, excitan vehementes dolores, y constituyen lo que llaman parto.

Las señales del embarazo son muy equivocas en los primeros meses, y aunque mas hayan dicho los Medicos, jamas es conocido el instante en que la muger à concebido.

Supuesto esto aparecen en el primero y segundo mes de su concepcion los sintomas siguientes: Seracion de menstros, peso en el hipogastrio, vomitos continuos, tumescencia de las mamas, dolor en los riñones y tirantez en las ingles; cuyos sinto-

mas todos deven estar reumidos para que de este modo podamos conocer el embarazo en el primero y segundo mes; y al mismo tiempo no confundirnos con las hidropesias.

Al tercero mes, hay un signo patognomónico, y es la clausura del orificio del Utero, y su inclinacion hacia el hueso sacro por la parte anterior.

Mas adelante, la madre percibe el movimiento del feto, aunque muchas veces suelen sentirlo al tercero ó quarto mes, ó antes; tambien percibe el Profesor este movimiento, haciendola poner en diferentes situaciones.

Se deve siempre tener presente, que el crecimiento del vientre, es de la parte inferior à la superior, para no confun-

diarlo con la Hidropesia del vientre, en la que siempre es esférico, y crece por todos sus puntos con igualdad; tambien dejarà de confundirse con la Hidropesia del Utero, siempre que lo veamos cerrado del tercero mes en adelante, lo que no sucede quando hay Hidropesia en esta viscera.

En el termino del embarazo se observan dos especies de sintomas distintos; unas sobrevienen del primero al tercero mes, y las otras en adelante: La nausea, el vomito, la pica, vertigo, afectos histericos, y los demas que se observan en los primeros dias y meses del preñado.

Proviene segun unos por el volumen aumentado que empieza à tomar el feto, y segun Boherave por la retencion del manto; pero bien considerado no puede

80  
sea ni lo uno ni lo otro; lo primero, por  
que si dependiesen del aumento del volumen  
que bñ tomando el fœtus, à proporcion de es-  
te aumento, serian mayores los sintomas,  
y siendo todo lo contrario, parece de nin-  
gun fundamento.

La de Boherave tan poco es accig-  
ble, pues muchas se hacen embarazadas  
al finalizar la menstruacion, y hasta el  
mes siguiente no tienen hecha la pletora  
parcial, por consiguiente hasta que acun-  
te esta abundancia de sangre al Utero, no  
debiam aparecer los sintomas dichos; como  
que no se observa, pues desde los prime-  
ros meses del preñado, empiezan à ex-  
perimentarlos; se infiere pues que es in-  
admisible esta opinion, y es menester acor-  
rar à otras causas.

81  
Estos sintomas bienen de otro meca-  
nismo, y parece probable; que asi como el  
licor seminal estimula al Utero, Trompas  
y Ovarios, puede muy bien este estimulo  
propagarse à todo el sistema nervioso, pues  
por la analogia vemos que para desarro-  
llar un Pollo de un huevo, solo necesita el  
estimulo prolifico del Gallo.

Estos sintomas son producidos por  
la irritacion del plexon solar, que se propa-  
ga à los demas plexons del cuerpo, y à pro-  
porcion que este se aumenta, igualmente  
lo hace la accion de las visceras, particular-  
mente del Higado y Bazo, sobre viniendo  
vomitos biliosos.

Parco que sucede à las mugeres lo  
mismo que à los demas animales quan-  
do estan en el Exoto Venereo, cuyas carnes

hectem de si un olor à Admiselo; lo que se conoce facilmente por el color diverso que presentan quando se corrompen que unicamente penden de la bilis, que distribuida en los vasos, se comunica à toda la carne, produciendo semejante olor.

Suelen calmar estos sintomas al tercero ò quarto mes, siguen sin novedad, hà aumentandose el volumen del fœtus, y al septimo u octavo, empiezan à sentir bastante peso en el hipo-gastro, impedimento en la orina, nausea, vomitos, almorraxas, y otras; cuya accion se unicamente mecanica y proviene del crecimiento del fœtus, produciendo la dificultad de la orina, por la inclinacion de este à la parte inferior, por cuyo medio se comprime el cuello del Vtero y viene este impedimento.

Por la misma compresion en los vasos hemorroidales, sobre vienen las almorraxas; y las nauseas y vomitos son por plethora del hígado, bazo y estomago; en efecto como hay compresion en todas las partes de la aorta inferior, hà mas copia de sangre por la celíaca, hay pues mayor secrecion de bilis, mayor copia, mayor estímulo, de donde se infiere que los primeros sintomas del preñado, son por un estímulo del Vtero, y los que vienen al fin, por una verdadera mecanica.

A veces sobre vienen ademas à los pies, y aun la Anasarca de las preñadas, por la compresion que sufren el sistema nervioso digo abreviamente; pero ya se habló de este sintoma.

Los sintomas que sobre vienen

84  
en el primer tiempo, se socoran no con  
la sangria, segun Boherave, à no ser en  
una pletorica, y que menstruar bien,  
pues si es demaciado devil siempre sera  
perjudicial.

Regularmente la cura la natura  
leza y el uso de los abroventas, es prescribible  
à todos la Magnesia à la dosis de medio  
scrupulo; si fuere necesario se harà uso  
de los antistericos corroborantes, pero siem  
pre se mirará con mucho respeto los opia  
dos por lo que ya llevamos dicho, alguna  
vez se les concederan aquello que appetu  
can.

Pasado el quarto mes, quando pa  
rece dependen los sintomas de pletora, y  
aparecen mayores à las entradas par  
ticularmente del noveno mes, se usará

85  
de una dicta regular y se sangrará al  
guna vez, advirtiendole que quando hay  
necesidad se harà en qualquiera tiempo,  
pero sino dejarà à la opinion que el vulgo  
Medico ha introducido en la opinion de las  
gentes.

Para la dificultad de orinar se usará  
del aceite de Alacranes, y otros; pero princi  
palmente la sonda procurandole que sea ori  
zontal la situacion que tenga la enferma.

Para las almorranas, se podrá  
sangrar alguna vez, y se usará interior  
mente de algunas sales neutras, y si hay  
mucho dolor se aplicaran à la parte, los  
unguentos amodinos, ò las hiliis con acy  
te comun y clara de huevo batida

Aborto.



Entre las varias enfermedades que ocurren en este tiempo, es esta una de ellas; succede en todos tiempos, pero principalmente al tercero mes, sobre dias mas ó menos; se cree succede ó consiste en la devilidad de la insercion de la placenta al Utero; pero sea esta u otra, se verifica, y reconoce varias causas.

La pletoxa universal ó parcial del Utero, los grandes espasmos de esta viscera produciendo la topica, las vehementes pasiones de animo esten ó no pletoxicas, las tocas ó estornudos violentos, los vomitos desordenados, aunque esta tiene muchos exorcismos, los narcoticos dados en el primero, segundo ó tercero mes, las evacuaciones excecivas, como diarrreas enormes, grandes hemorragias, y sangrias.

Quando esta muger es propensa al aborto, es necesario indagar la causa que preciberala, lo que se haria fuera del tiempo del embarazo ó al principio de él; si huviere algun vicio particular se quitaria y se entonaria con los ya dichos; si procediere de pletoxa, sangrar, se pondria u una dieta regular, se tendra en quietud evitando las indigestiones y congestiones de bilis; si procede de spasmos, se usara de los antispasmodicos, interiormente el agua de torongil, arastida, à la vagina el agua de torongil, y à los lomos el emplasto de cicuta, ó galbano; evitando los confortantes por aumentar el spasma.

Es necesario satisfacer con prontitud las indicaciones que ocurran.

Si la enferma arroja mucha sangre

por la vagina, tiene preso al empuje, fluctúan las mamas, dolorcillo como de punta, dolor à los riñones, devemos tener presente que puede muy bien retardarse el aborto; si queremos detener el flujo (hasta que esté hecha la expulsión) digo particularmente si la placenta está separada; en cuyo caso puede retardarse esta hecha la expulsión, y luego que se verificase, se deberá cohibir la sangre, por que tardan mucho en combaten.

No deve entenderse esto del quinto mes en adelante; los fluxos si son copiosos devien contenerse, pues si en el tercero no trae el mayor peligro; del quinto en adelante, traen mucho; para contenerlo no hay mas remedio que la contracción del Utero y por consiguiente la expulsión del feto, que no se puede verificar por

tar los dolores, y si acaso à habido suficiente dilatación para la expulsión, y la enferma ha perdido mucha sangre, me le haberes morir en la contracción.

Para curar este flujo, deberemos ver si es incipiente, sino tiene causa manifiesta, si hay esperanzas que no se haya comprendido del todo; en cuyo caso, se tendrá à una buena dieta, se desahogará el canal intestinal, se harán una ó dos sangrias de los brazos, se usará de algunos acidos, à no haber diatesis histérica, y el agua fria de nieve, ó el vinagre agnado.

Si estos no bastan, y hay tirantes en los muelas, preso en el empuje, continuá el flujo, el dolor en los riñones <sup>de</sup> contemplaremos que está separada la placenta, y así se solicitará prontamente la expulsión; se usará de los emolientes que

estimulen muy blandamente y asi los panos de manteca bien caliente ó con la cataplasma de manteca y malvas machacadas y al Utero los baños emolientes.

Accha la expulsion se fajarà ligeramente y estará dos ó tres dias en la cama.

Si hubiere diatesis histerica, suele ser el flujo inordinado, y no aprovechando estos, tienen lugar los opiados.

## Parto.

Parce muy conducente saber que es el parto natural y sus diferencias, como tambien sus causas determinantes.

Se llama parto à la expulsion natural del feto con sus partes adyacentes, y propias fuera de la matriz à su devido tiempo, siendo unicamente excitada por las

naturaleza.

El tiempo regular es à los nueve meses poco mas ó menos, aunque algunas tardan mas y otras menos.

El parto se divide en natural y preternatural.

Natural el que viene à su tiempo y se deve unicamente à la accion de la naturaleza.

Preternatural, el que viene à su tiempo, y necesita de auxilio del arte.

Tiene varias causas determinantes, las que son ciertas para muchos practicos; la primera, es crecimiento de la criatura, quando llega el Utero à su incremento produce contracciones spasmodicas, y seguidamente el parto.

La segunda, es el peso mecanico

92.  
del fœtus, aunque sobre esto han creído  
muchas fabulas, pues lo colocan encogido,  
doblado los miembros y piernas aquellos  
hacia la barba, estos sobre los brazos, los  
brazos y antebrazos sobre los miembros, y  
con la cabeza al fondo del Utero; en cuyo  
situacion dicen estan hasta los cinco me-  
ses, pues siendo respectivamente mayor  
que el cuerpo, cae por su peso mecanico  
hacia la pelvis; pero esta opinion, tiene à  
la experiencia contraria, pues en todos los  
meses se encuentran los fœtus cabeza abaxo,  
y los que las tienen arriba siempre à  
ten de pies, ò de nalgas.

Otra, en los que ponen el movimiento  
extraordinario del fœtus, lo que atribuyen  
à la irritacion que el meconio produce  
en el canal intestinal; pero esta

93.  
opinion no està bastante comprobada.

Otra, dicen que es la sensacion  
que la orina excita en la vejiga del fœtus;  
pero tan poco tenemos datos que lo  
confirman.

Creemos pues que unicamente  
depende del aumento de volumen de la  
materna, placenta y sangre, pues asi co-  
mo hay mas copia de esta se verifica el  
aumento del circulo del corazon, son  
mas frecuentes sus contracciones, y los  
humores circulan con mas velocidad,  
del mismo modo habiendo al noveno  
mes una gran copia de sangre en la pla-  
centa y demas vasos ha de haber mayor  
estimulo, y se ha de aumentar la accion  
del Utero.

No es necesario para què el fœtus

94.  
tus salga que se haga conato alguno; la sola contraccion del Utero lo expelle con las secundinas y gromos de sangre subyugivantes, y las experiencias hechas por el celebre Boudelo', nos convencieron de esta verdad.

Hay ciertas señales que devemos tener presentes para conocer el parto y distinguirle bien.

Primera mente devemos distinguir el tiempo si está cumplido, contando siempre desde la ultima menstruacion que tuvo.

En segundo lugar, la decadencia del vientre, cuyo volumen se aumenta hacia el empuje estando mas ligeros.

En tercero, se verá si los dolores son intermitentes de las ingles á las caderas y lomos, y si en el acto del dolor hacen micción micción micción para abajo, y por último

95.  
mo si hay humedades en la Vagina.

Se conoce que empieza si metiendo el dedo hacia la parte posterior del Utero, se halla dilatado de arriba abajo y de atrás adelante, y que continúa, quando aumentando los dolores se hacen mas circulares, se empieza à poner perpendicular el Utero, y arrojan una mucosidad sanguinea llamada limas; siguen los dolores, viene la disuria y el tenesmo, se adelgaza el orificio del Utero y puesto perpendicular, presenta el feto la fontanela anterior, ó posterior, la cara deve venir mirando al hueso sacro, presenta la cabeza, se aumentan los dolores, se rompe el perineo en las primicias, se inclina la cara un poco al muro, sale el feto, se corta el ombligo, y á cada por ambas partes, descanza la par-

turienta, sobre vienen nuevos dolores, se aumenta la contraccion, y se expulsa la placenta.

Como las mas de las veces se rompe el perinco à las primicias, suele incomodarla mucho la orina; en cuyo caso se le aplica unas hilas empapadas en una clara de huevo batida con agua; à estas regularmente no viene dolor alguno despues del parto primero, pero en el segundo y tercero à las ocho ò diez horas, vienen fuertes dolores y contricciones, impidiendo à arrancar gajos de sangre; siguen despues los loquios que duran quince ò veinte dias, saliendo la sangre al principio muy pura y abundante, despues aguada obscura, y algo escasa, y esto

mamente blauguicina y puriforme.

À los dos ò tres dias despues del parto, sobre viene la calentura efemera lactea.

## Parto dificil.

Esto es aquel preternatural en el que no valen los esfuerzos de la naturaleza, y es necesario el socorro del arte.

El parto es dificil, ò por la madre, ò por la mala situacion del fetus.

Es originado por la Madre, si esta es debil, enferma, de poca edad, ò de mucha, de mala conformacion y primicia, particularmente si es irritable, en cuyos casos se producen convulsiones, y es necesario el socorro del Arte.

Los vapores y baños de agua tibia y aun el Opio conviene en este caso; las de treinta y cinco años en adelante, tienen el parto difícil, por que sus huesos son muy duros, los cartilagos de la Sinfis de pubis son tambien duros, no dan de si, se acercan a la orificacion, y el Utero no tiene ya tanta iritabilidad; todo lo que contribuye a hacerlo difícil.

Las contra hechas y forobadas que tienen vicio en la pelvis, no lo tienen fácil, pues necesitandose una respiracion quando y libre, no la tienen estas, ó bien por que un lado de las costillas es mas largo que el otro ó por estar encorbada la espina del dorso.

Las dislocaciones del femur, ó disminución de diametro de la cavidad de la pelvis por exostosis, contribuyen a dificultar el parto.

Por parte del fetus se hace difícil, quando este de una magnitud extraordinaria, aunque rara vez se observa, pues naturalmente queda mucho al Utero y la Vagina, pudiendo al mismo tiempo comprimirse ó prolongarse tanto la cabeza como las demas partes gruesas, por defecto de osificacion; será difícil en el caso de tener dos cabezas, u otra monstruosidad.

El hidrocefalo externo, lo concideran como otra de las causas que pueden dificultarlo, pero pueden tambien prolongarse los esfuerzos y salir con facilidad.

La muerte del fetus, pero ya se ha dicho que basta solo la iritabilidad del Utero que continua algun tiempo aun despues de muerta la madre para hacer la expulsion; por consiguiente solo en el caso de haver

corrupcion adquiriendo mucho volumen, se  
hace muy difícil, y mas por la putrefaccion  
que comunica à las partes inmediatas.

Finalmente, por presentar parte que  
no es natural, como dar una mano y un  
pie, aunque muchos dicen que es muy  
buena postura, venir de nalgas, y otras,  
la situacion regular es de cabeza, ó de pies,  
si lo primero presentando la fontanela an-  
terior ó posterior; si lo segundo, los puntas  
de los dedos de los pies han de mirar atrás,  
pues toda esta postura es mala.

El que quiera instruirse bien en el  
tratado de partos, puede leer à Moriso, Le  
buciat, Lebaet, Budelo, y la embriologia de  
Grada de Cangiamila.

Puede tambien hacerse el parto  
difícil, por estar la Matriz con algunas

moles scianosas, ó por falta de irritacion y  
tono.

Aun se hace mas difícil, quando las  
membranas del feto que lo cubren, son  
de un gualco extraordinario, y no pueden  
romperse naturalmente, ó quando la pla-  
centa está adherida al Utero, que no puede  
separarse sin dislaceracion, ó inbentir la  
parte interior, produciendo gravissima  
malas, y sobre todo la Hemorragia de las  
paridas, que en menos de dos minutos  
le quita la vida.

## De las Enfermedades del Puer- perio. —

Las recién paridas están sujetas à muchas  
enfermedades, y en particular à la de la ir-  
ritacion; por lo que así como en toda enfer-



102a  
medad intaga un Medico prudente si hay  
cacochilia, pletora &c. no menos deve hacerlo  
en el puerperio, por que las enfermedades de  
las puerperas, exigen toda la atencion y ci-  
encia del facultativo.

Dejando à parte las escoriaciones  
de la vulva, perforaciones del Perineo, tubos  
lactiferos, y otras enfermedades, que pare-  
cen son del resorte de la Cirugia; pasare-  
mos à hablar de las.

## Transmutaciones de la Leche.

Muchas mugeres que son debiles, irritables,  
sensibles y cachecticas, suelen ser acometidas  
de lipotimias despues de haver parido; al ter-  
cero, quarto ò quinto dia, sube la leche, pre-  
cediendo una efera que termina en sudor co-  
pioso.

102a  
Otras tienen mucha dificultad para  
subirle la leche, la que se transmuta facil-  
mente à otras partes, y produce enfermedades  
inflamatorias; en cuyo caso la calentura lac-  
tea sigue con impetu; baxa tres ò quatro ho-  
ras y se reanuda con mas fuerza, se disminu-  
ye la turgencia de las mamas hasta lle-  
gar à ponerse enteramente flaccidas, hay do-  
lor mas ò menos agudo en la parte donde  
bà à parar la leche, y tambien daño en  
ella, y las enfermedades consiguientes; si  
bà al pulmon, habrá ecchimosos, toz seca,  
dificultad de respirar &c. por lo que no de-  
vemos confundirnos en la practica, pues  
esta calentura unas veces sobre viene à ella  
la transmutacion de la leche, y otras he-  
cha la transmutacion se produce la fie-  
bre.

Estas mutaciones lacteas son mas ó menos peligrosas, segun donde se depositan; no sea tanto si se depone en los muelles, pelvis, trompas, ovarios; como si es en el pecho, vientre, y mucho mas si llegan á suprimirse los lognios, pues produciendo disoluciones una fiebre inflamatoria adquiere el caractex de putrida que sobre viniendo sintomas nerviosos, se hace un caso muy complicado é incurable por lo regular.

Esta enfermedad se cura con diferentes indicaciones; si es muger pobre, robusta, de buenos colores, y hay algunos sintomas de inflamacion, se pondrá á dieta tenue, se sangrará algun tanto, y sobre todo el desahogo del canal intestinal, pues por lo regular en todo este baraxo hay una cacochilia gastrica

liosa, y asi sin temer se han de dar los emeticos para limpiar el vientre y precaver las diarreas tan funestas en esta enfermedad; se usará del plan antiflogistico; despues se promoveran los Lognios, y se aumentará la secrecion de la orina; camino muy propio para expeler la materia lactea denominada.

Está recomendado el arcano duplicado de medio escrupulo á uno cada quatro horas.

Si esta transmutacion es al Pulmon, ademas de lo dicho, se hará uso del Kermes mineral; y si fuere muy grande el acopio de materia lactea prontamente los vegetatorios.

Por topicos han puesto, si es en el vientre todos los q.<sup>l</sup> se usan en qualquier dolor; pero inutiles por que enfriandose se buelven refrigerantes.

Los neñaños solo en España estan en uso, y aunque por razon y experiencia estamos convencidos de su inutilidad, con todo no hay quien sague à los Medicos antiguos de semejante error.

La Apoplexia lactea lo mismo que la serosa, cantaridas à la Nuca y picornas, por ganta fuerter &c.

Deviamos tratar de la calentura peripheral, pero habiendose explicado en el tratado de estas, nos referiremos à ellas y recomendarémos su lectura en el tratado que trata el celebre Vosguillon en el de Cullen.

## Enfermedades de Niños.

Los Niños estan sujetos à muchas enfermedades peculiares à la edad, de las quales muchas son del acorte de la Cirujia, como la im-

perforacion de la boca, parpados, meatos urinarios, y la mas frecuente, es la del Ano.

Esta por lo regular se cura introduciendo el dedo poco despues de haber nacido; pero si depende de la coalicion del recto, es insuficiente este medio, y no los son mucho menos algunos instrumentos que usan para dicha operacion.

Otras son del acorte de la Medicina, como las Afisias que sobre vienen à los partos dificiles; en cuyo caso, luego que fué extraida la criatura, no se deve abandonar jamas à no salir concompida en sus partes principales; sino que deveran emplearse los remedios mas eficaces y prontos; y asi lo primero deveran poner à la corriente del ayre libre, soplarles el pulmon, aplicarles la sal y vinagre al paladar, el hu-

mo del tabaco de oja à los intestinos, y sino bastare el alcali volatil, la electricidad y el oxigeno al pulmon si se le pudiere introducir.

Debe dejarse buelto el cordón umbilical, para saver con evidencia quando empieza à circular la sangre.

### Del Colico Mecornial.

Es muy frecuente en los Niños esta enfermedad, es solamente producto del Mecornio detenido, el q. no es mas que una porcion de bilis degenerada en las intestinas.

Se conoce dicha enfermedad, por que no la han arrojado, ó muy poco, por el llanto continuo del Ynfante, por la inquietud continua, encogimiento de muelas y hombros, y finalmente por el aumento del llanto à

la compresion del Abdomen.

Se precabe, ó purgandolos ó haciendolos vomitar; pero suele bastar el primero; han hecho mano de los acydes, pero siempre suelen perjudicar, pues irritandose producen una acrimonia oleosa; el Jarabe de althica, de pconia, pero es preferible el de chiconias con ruibarbo, poniendo à dos onzas de este, una dragma de magnesia y dadolo à cucharaditas.

No nos debemos acustar por ver la orina sanguinolenta y que tinte los pañales, pues esto consiste solamente en el ruibarbo.

Si acaso con estos remedios no obran, se aumentasen los dolores y temblores la Alferccia, el emetico, como el agua emetizada.

Siempre deben mamar los Niños la primera leche, y es un error ó crueldad de las madres, darles inmediatamente à mamar leche de otras que están criando.

Provida la naturaleza ha criado los primeros dias los calostros, para que limpiando perfectamente el estomago é intestinos, obran como unos purgantes naturales; con cuyo medio pueda nutrirse el Infante sin temor de que le sobrevenga muchas enfermedades, que las madres por esta imprudencia las ocasionan.

Se deve tener cuidado con el Ombligo hasta que se separe, y para asiximar la cutis, han usado de los polvos de arrayan, albollarce, rosas y otros.

Tambien cometen las madres un grande error, comprimiendo las cabezas

de los Niños, pues luego se siguen los efectos consiguientes à esta barbarie, quales son debilidad, insensibilidad y estupidez.

La Tabes infantil y el hidrocefalo, son dos enfermedades propia de los Niños, pero ya se ha dicho en las Cachexias, quanto hay que decir sobre ellas, lo mismo que de la ragnitis.

Por lo que toca la crista lactea podemos referirnos à las enfermedades cutaneas del Pene.

Ultimamente la Viruelas, Sarampion y otras quedan explicadas en el tratado de inflamacion con bastante extension, y asi nos parece conducente que lo leamos en dicho tratado.

## Indice.

Introducción general	1
Primer libro	16
Tratado de las Pícuras	32
Quarantena	44
Alcaz Albus	53
Alcalgía	65
Altemidad	72
Alanca	76
Alato	95
Alata	90
Alto difícil	97
Alformidad del Pucpucis	101
Alformitacione de la leche	102
Alformidad de las Niñas	106
Alto Alcanial	107

# Indice.

Enfermedades en general . . . . .	1
Clonosis . . . . .	16
Clonosis de las Puerperas . . . . .	32
Menorragia . . . . .	44
Fluxu Albu . . . . .	53
Histeralgia . . . . .	65
Esterilidad . . . . .	72
Puerperas . . . . .	76
Aborto . . . . .	85
Panto . . . . .	90
Panto difícil . . . . .	97
Enfermedades del Puerperio . . . . .	101
Transmutaciones de la leche . . . . .	102
Enfermedades de los Niños . . . . .	106
Colico Meconial . . . . .	108

Index

1 .....  
26 .....  
28 .....  
44 .....  
53 .....  
62 .....  
72 .....  
76 .....  
83 .....  
90 .....  
97 .....  
101 .....  
102 .....  
103 .....







P. 12

169



